

## ЗАМЕТКИ ПО БИОЛОГИИ ЖЕЛТОБРОХОЙ ПЕНОЧКИ

Кукиш А.И., Музаев В.М.

Калмыцкий госуниверситет, Элиста

В пределах Кавказа гнездовой ареал желтобрюхой пеночки простирается к северу до лесов Ставропольской возвышенности и охватывает зону широколиственных и смешанных лесов среднегорья (Иванов, 1976; Степанян, 1978). Большинство исследователей характеризуют ее как обычный (Аверин, Насимович, 1938; Беме, 1958; Моламутова, 1967), местами доминантный гнездящийся вид (Поливанов, Поливанова, 1986; Комаров, 1991). Вместе с тем, сведений по биологии этого вида крайне мало.

В северной части Лагонякского нагорья, в окрестностях биостанции "Камышанова Поляна" желтобрюхая пеночка на гнездовье обычна, но немногочисленна. Гнездо с кладкой из трех яиц было обнаружено нами 14 июля 1991г. в верховьях р. Мазмайки. Располагалось оно на южном склоне утесья, поросшего буково-пихтовым лесом, в основании маленькой пихточки. Птенцы появились в гнезде 16-го, а вылетели 27 июля. В период выкармливания птенцов оба члена родительской пары были отловлены. Результаты притиз-