

BEAUTIFUL

Первый антиангинальный препарат,
уменьшающий риск коронарных осложнений*

Кораксан®

Ивабрадин

Первый I_f ингибитор селективного и специфического действия



Как показало исследование BEAUTIFUL, Кораксан может применяться в сочетании с любыми антиангинальными средствами, в том числе с бета-блокаторами³

Состав: Делимые таблетки, покрытые оболочкой, содержащие каждая 5 мг или 7,5 мг ивабрадина гидрохлорида. **Дозировка и способ применения:** Стартовая дозировка 5 мг — 1 таблетка 2 раза в сутки, во время еды: завтрак и ужин. Дозировка может быть увеличена до 7,5 мг 2 раза в сутки через 1 месяц терапии, в зависимости от терапевтического ответа. При снижении ЧСС менее 50 ударов в минуту в покое дозировка должна быть уменьшена до 2,5 мг 2 раза в сутки. **Фармакологическое действие:** Кораксан действует только на снижение ЧСС, благодаря селективной и специфической ингибции ионных токов I_f синусового узла, контролирующей спонтанную диастолическую деполяризацию синусового узла и частоту сердечных сокращений. Кораксан снижает ЧСС в зависимости от дозировки и обеспечивает высокую антиишемическую и антиангинальную эффективность.

Регистрационный номер ЛС-000885 от 03.11.2005

*у пациентов с ИБС, дисфункцией левого желудочка, с фракцией выброса <40% и ЧСС >70 уд/мин, как было показано в исследовании BEAUTIFUL



115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Тел.: (495) 937 07 00; факс: (495) 937 07 01.



Кораксан, благодаря селективному снижению ЧСС, обеспечивает:

- Эффективный контроль приступов стенокардии¹
- Улучшение переносимости физических нагрузок²
- Снижение риска инфаркта миокарда на **36% всего за 2 года терапии³**
- Снижение потребности в реваскуляризации на **30%³**

1 таблетка 2 раза в сутки

ВРАЧ

ISSN 0236-3054

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал

Издается с мая 1990 года

№ 6

XIX век



XX век



XXI век



Авторитет и традиции — из века в век

- Инновационная диагностика урологических заболеваний
- Внутривенная химиотерапия при распространенном раке яичников
- Почечные отеки: механизмы развития, принципы лечения
- Клинико-морфологические аспекты хронического простатита
- Клинический разбор: Гепаторенальный синдром, напряженный асцит, спонтанный бактериальный перитонит — множественные осложнения вирусного цирроза печени
- Влияние методов лечения опухолей гипофиза на мужскую половую функцию

ИЮНЬ 20 лет 2010



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»

www.rusvrach.ru

1. Tardif JC et al. Eur Heart J. 2005;26:2529-2536.
2. Borer JS et al. Circulation. 2003;107:817-823.
3. Fox K et al. Lancet. 2008;372:807-816.



КО-ДИРОТОН


10 или 20 мг лизиноприла + 12,5 гидрохлоротиазида
по 10 или 30 таблеток в упаковке

**ЕДИНСТВЕННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ
БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕЧЕНЬ**

ВВ! Усиление гипотензивного действия

ВВ! Снижение частоты
побочных эффектов

ВВ! Удобство приема – 1 раз в день



ЛЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА — ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ



ГЕДЕОН РИХТЕР

Представительство ОАО «Геден Рихтер» (Венгрия): г. Москва 119049, 4-й Добрынинский пер., д. 8
Тел.: (495) 363-3950, Факс: (495) 363-3949 e-mail: centr@g-richter.ru www.g-richter.ru

Сиалис® – к жизни без эректильной дисфункции

- Сиалис® – твердость результата^{1, 2}
- Сиалис® – быстрота и длительность действия³
- 7 из 10 мужчин выбрали Сиалис®⁴



СИАЛИС® (CIALIS®)

Международное (непатентованное) название: Тадалафил.

Фармакотерапевтическая группа: Эректильной дисфункции средство лечения, ФДЭ-5 ингибитор. Тадалафил является эффективным, обратимым селективным ингибитором специфической фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ5) циклического гуанозин монофосфата (цГМФ).


Показания к применению: Нарушения эрекции.

Противопоказания: Установленная повышенная чувствительность к тадалафилу или к любому веществу, входящему в состав препарата; В случае приема препаратов, содержащих любые органические нитраты; Применение у лиц до 18 лет.

Способ применения и дозы: Для приема внутрь. Рекомендованная максимальная доза препарата СИАЛИС® составляет 20 мг. СИАЛИС принимают перед предполагаемой сексуальной активностью независимо от приема пищи. Препарат следует принимать как минимум за 16 минут до предполагаемой сексуальной активности. Максимальная рекомендованная частота приема – один раз в сутки.

Побочное действие: Наиболее часто отмечаемыми нежелательными событиями являются головная боль и диспепсия (11 и 7% случаев, соответственно). Нежелательные события, связанные с приемом тадалафила, были обычно незначительными или средними по степени выраженности, транзиторными и уменьшались при продолжении применения препарата. Другими обычными нежелательными эффектами являлись боль в спине, миалгия, заложенность носа и «приливы» крови к лицу.

Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг по 1, 2, 4 таблетки в упаковке.



1. Carson CC et al. The efficacy and safety of tadalafil: an update. BJU International 2004;93: 1276-1281
2. Eardley et al. An open-label, multicenter, randomized, crossover study comparing sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile dysfunction in men naive to phosphodiesterase 5 inhibitor therapy. BJU International 2005; 96: 1323-32.
3. Brock GB, McMahonCG et al. Efficacy and safety of tadalafil for the treatment of ED: results of integrated analyses. J Urol 2002;168(4):1
4. Hatzichristou D et al. Effect of tadalafil on sexual timing behavior patterns in men with erectile dysfunction: integrated analysis of randomized, placebo controlled trials. J Urol, 2005; 174: 1356-1359

Эли Лилли Восток С.А.
123317, Москва, Пресненская наб., 10
Тел.: (495) 258 50 01, (495) 258 50 05
www.bud-uveren.ru

Lilly

Answers That Matter.