

№ по порядку.	Название болѣзни.	Распредел. по возрасту.							Число больных.			Число дней проведен. болн.	
		До 5 л.	До 15 л.	До 25 л.	До 35 л.	До 45 л.	До 55 л.	Свыше 55 л.	Мужч.	Женщ.	Итого.	Общее.	Среднее.
59	Катаракта перезрѣлая	—	—	—	—	1	—	5	6	—	6	89	14,8
60	„ черная	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	20	20,0
61	„ глаукоматозная	—	—	—	—	—	—	9	8	1	9	113	12,5
62	„ травматическая	—	—	4	2	1	—	—	5	2	7	33	4,7
63	„ осложненная	1	1	1	—	—	5	2	7	3	10	287	28,7
64	„ слоистая	—	2	2	1	—	—	—	2	3	5	132	26,4
65	„ атрофическая	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	28	14,0
66	„ вторичная	—	—	2	1	—	3	14	14	6	20	100	5,0
67	Вывихъ хрусталика (катаракт.) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	10	10,0
Болѣзни сосудистой оболочки.													
68	Воспаленіе сосудистой оболочки . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	15	15,0
69	Глаукома простая (первичная)	—	—	—	—	2	4	23	19	10	29	348	12,0
70	„ воспалительная острая	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	37	18,5
71	„ „ хроническая	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	28	14,0
72	„ вторичная	—	—	4	—	—	1	—	3	2	5	51	10,2
73	„ абсолютная	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1,0
Болѣзни стекловиднаго тѣла.													
74	Кровоизліяніе въ стекловидное тѣло .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	7	7,0
75	Выпаденіе стекловиднаго тѣла . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	11	11,0
76	Постороннее тѣло	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	2,0
Болѣзни сѣтчатки и зрительн. нерва.													
77	Астенопія сѣтчатки (истерическая) .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	24	24,0
78	Отслоеніе сѣтчатки	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	10	10,0
79	Воспаленіе сѣтчатки и зрительн. нерва	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	24	12,0
80	„ зрительнаго нерва	—	—	4	1	—	1	—	3	3	6	138	23,0

№ по порядку.	Название болѣзни.	Распредел. по возрасту.							Число больных.			Число дней проведен. больн.	
		До 5 л.	До 15 л.	До 25 л.	До 35 л.	До 45 л.	До 55 л.	Свыше 55 л.	Мужч.	Женщ.	Итого.	Общес.	Среднее.
81	Атрофія зрительнаго нерва	—	—	—	1	2	1	—	3	1	4	65	16,2
82	Притупленіе зрѣнія безъ объективнаго измѣненія глаза	—	—	—	—	3	—	—	3	—	3	22	7,3
Болѣзни нерво-мышечн. аппарата гл.													
83	Внутреннее косоглазіе	—	—	3	—	1	—	—	2	2	4	15	3,7
84	Наружное „	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	4,0
Болѣзни всего глазного яблока.													
85	Выпячиваніе глазного яблока	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	9	9,0
86	Абсцессъ „ „	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	5,0
87	Гнойное восп. „ „	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10	10,0
88	Атрофія „ „	—	—	—	4	—	—	—	4	—	4	39	9,7
89	Раненіе „ „	1	—	1	1	1	—	1	5	—	5	36	7,2
90	Ушибъ „ „	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2	5	2,5
И т о г о		8	64	148	87	80	71	197	366	289	655	8848	14,3
91	Здоровыхъ людей *)	2	1	2	3	4	2	—	2	12	14	91	6,5
В С Е Г О		10	65	150	90	84	73	197	368	301	669	8939	13,4

*) Изъ 14 здоровыхъ человѣкъ—12 были въ качествѣ ухаживающихъ за больными дѣтьми, а 2 грудныхъ дѣтей—при больныхъ матеряхъ.

Вѣдомость № 3 показываетъ количество и названіе операцій.

Вѣдомость № 3 о числѣ операцій, сдѣланныхъ стаціонарнымъ больнымъ глазного отдѣленія за 1900 годъ.

№ по- рядку.	Н а з в а н і е о п е р а ц і й.	Число операцій.
1	Извлеченіе катаракты	162
2	Татуировка	104
3	Иридектomia	103
4	Операція при заворотѣ вѣкъ (по разнымъ способ.)	78 *)
5	Расщепленіе слезныхъ капальцевъ	59
6	Дисцизія катаракты	37
7	Склеротомія	23
8	Удаленіе рѣсницъ электролизомъ	19
9	Операція для исправленія косоглазія	8
10	Вылущеніе глазного яблока	7
11	Изсѣченіе опухоли (злокачественной)	7
12	Стафилотомія по способу Критчета	6
13	Извлеченіе разбухшихъ кортикальн. массъ	5
14	Наложеніе лигатуръ Gaillard'a	5
15	Удаленіе постороннихъ тѣлъ изъ разн. средъ гл.	3
16	Тарсорафія по Рудину	3
17	Наложеніе лигатуръ Schneller'a	3
18	Иридотомія	

*) По способу Snellen-Hotz'a—49, Schneller'a—24, Когана-Иванова—2, Анагноста-киса—2 и по способу Сапеевко—1.

№ по порядку.	Н а з в а н і е о п е р а ц і й.	Число операций.
19	Соскабливаніе помутнѣннй роговицы	2
20	Извлеченіе сумки хрусталика	2
21	Операция по способу Рапар'sа (при опущен. вѣка)	2
22	Вылущеніе градины	2
23	Вскрытіе абсцесса	2
24	„ слезнаго мѣшка	1
25	„ кисты орбиты	1
26	Операция при сращеніи вѣкъ съ глазн. яблоком.	1
27	„ противоотверстія для оттока слезъ	1
28	Разсѣченіе катаракты по Wecker'у	1
	И Т О Г О	649

Поясненіе къ оперативной вѣдомости № 3.

Хлороформированіе примѣнялось въ 9 случаяхъ: при 2-хъ дисцизіяхъ катарактъ (амбулаторнымъ больнымъ, см. табл. № 1), при 3-хъ вылущеніяхъ глазного яблока, 1-й операции ptosis'a и при 3-хъ изсѣченіяхъ злокачественной опухоли, во всѣхъ случаяхъ наркозъ протекалъ правильно.

При остальныхъ пластическихъ операціяхъ, вылущеніяхъ опухолей и операц. косоглазія производилась мѣстная анестезія по способу Schleich'a, при чемъ употреблялся растворъ кокаина съ экаиномъ по ровну, въ дозахъ отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ грана того и другого.

Изъ 7 энуклеацій глазного яблока—3 сдѣланы по поводу болѣзненной атрофіи, при чемъ замѣтно было вредное вліяніе пораженія на здоровый глазъ; такъ, у одного больного острота зрѣнія въ здоровомъ

глазу была понижена до $\frac{10}{\text{сс}}$ при нормальной офтальмоскопической картинѣ, а на 3-й день послѣ вылуценія атрофическаго глаза $v = \frac{20}{\text{сс}}$; 2 энуклеаціи сдѣланы при симпатическомъ иридоциклитѣ, 1—при сильно-выпяченной рѣсничной стафиломѣ и 1—для ношенія протеза.

Извлеченій катарактъ петлеобразной ложечкой сдѣлано 7, при чемъ въ 4 случ. было незначительное выпаденіе стекловиднаго тѣла.

Изъ 167 извлеченій катарактъ (сюда включены 5 извлеченій разбухшихъ кортикальныхъ массъ), 6 случаевъ осложнились, въ періодѣ заживленія, нагноеніемъ, что составляетъ 3,6%.

Выраженныхъ панеофтальмитовъ не было ни одного. Всѣ случаи нагноенія ограничились хуроруон'ами. Въ 2-хъ случаяхъ хуроруон'ы разсосались безслѣдно, въ 2-хъ другихъ случаяхъ хуроруон'ы также разсосались, но получились вторичныя катаракты (одному изъ этихъ больныхъ въ послѣдствіи была сдѣлана дисцизія, при чемъ онъ выпи-
саясь при $v = \frac{10}{\text{сс}}$ съ convex 11,0 D), 2 больн. выписались съ ограничившимися хуроруон'ами.

По времени появленія, нагноенія распредѣлялись такъ: на 2-й день—3, на 3-й—2 и на 4-й день—1 случ. Легкихъ иритовъ было 5, что составляетъ 3%, изъ нихъ 2 появились на 2-й день, 2 на 3-й и 1 на 4-й день. Всѣ ириты прошли отъ усиленной атропинизаціи спустя 2 или 3 дня.

Кровоизліяній въ переднюю камеру глаза въ періодѣ заживленія было 6. Причиной кровоизліяній во всѣхъ случаяхъ была неосторожность самихъ больныхъ. Въ 1 случаѣ кровоизліяніе произошло на 3-й день, въ 1 на 5-й, въ 1 на 6-й, въ 2 на 7-й и 1 на 9-й день.

У 3 больныхъ кровоизліянія разсосались безслѣдно, у 2-хъ образовались вторичныя катаракты, а одинъ больной выписался съ остатками кровоизліянія.

Осложненій при другихъ операціяхъ не наблюдалось. Всѣ пластическія операціи заживали первымъ натяженіемъ.

Въ заключеніе надо упомянуть, что трудъ по веденію дѣла раздѣляли временно врачъ П. М. Введенскій и ж. врачъ М. Н. Фейтъ.

Коморовичъ.