

# СОДЕРЖАНИЕ

Том 58, Номер 5, 2018

Многолетние изменения роли местных и инвазийных видов рыб в питании хищных рыб Рыбинского водохранилища <i>Ю. В. Герасимов, М. Н. Иванова, А. Н. Свирская</i>	507
Восстановление валидности и переописание южного катрана <i>Squalus probatovi</i> (Squalidae) — самостоятельного вида из вод Анголы <i>С. Т. Ф. Л. Виана, М. Р. де Карвальо</i>	523
Аннотированный список морской и солоноватоводной ихтиофауны залива Анива (Охотское море, о. Сахалин). 2. Семейства Cyclopteridae—Molidae <i>Ю. В. Дылдин, А. М. Орлов, А. Я. Великанов, С. С. Макеев, В. И. Романов, Л. Ганель</i>	524
Сравнительный морфологический анализ клонального потомства самки гибрида стерлядь <i>Acipenser ruthenus</i> × калуга <i>A. dauricus</i> (Acipenseridae): генетическая и модификационная изменчивость ряда количественных морфологических признаков <i>Е. Д. Васильева, Е. И. Рачек, Д. Ю. Амвросов, В. П. Васильев</i>	525
Эволюция стайного поведения рыб <i>А. О. Касумян, Д. С. Павлов</i>	534
Фауна крылаток рода <i>Dendrochirus</i> (Scorpaenidae, Pteroinae) коралловых рифов залива Нячанг (Южно-Китайское море, Центральный Вьетнам) <i>Д. А. Астахов</i>	544
О морфологии слепого языка <i>Typhlachirus elongatus</i> (Soleidae) с замечаниями по таксономии рода <i>Typhlachirus</i> <i>С. А. Евсеенко, Д. В. Большаков</i>	553
Особенности пространственной структуры микижи <i>Parasalmo mykiss</i> в реке Коль, Западная Камчатка. К вопросу об интегрированности популяции в бассейне сложной речной системы <i>К. В. Кузищин, М. А. Груздева, С. Д. Павлов, А. В. Семёнова, Д. С. Павлов</i>	560
Ихтиопланктон арктических морей России. 1. Сайка <i>Boreogadus saida</i> <i>А. В. Мишин, С. А. Евсеенко, Д. В. Большаков, Я. Ю. Большакова</i>	577
Влияние тиомочевины на поведение анабаса <i>Anabas testudineus</i> в потоке воды <i>Е. Д. Павлов, Д. С. Павлов, Е. В. Ганжа, М. М. Шарова, Чан Дык Зьен</i>	584
Особенности раннего онтогенеза белого гольца <i>Salvelinus malma complex</i> (Salmonidae) Кроноцкого озера (Восточная Камчатка) <i>М. Ю. Пичугин, Г. Н. Маркевич</i>	589
Динамика продукционных характеристик сайки <i>Boreogadus saida</i> (Gadidae) в Баренцевом море <i>Е. В. Расхожева, О. В. Карамушко</i>	599
Связь питания молоди кеты <i>Oncorhynchus keta</i> и горбуши <i>O. gorbuscha</i> с обилием зоопланктона в прибрежье залива Простор (о. Итуруп) <i>В. В. Чебанова, С. Э. Френкель, Г. С. Зеленихина</i>	608

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Первая поимка бирюзовополосого группера <i>Cephalopholis formosa</i> (Serranidae) в морских водах побережья Орисса, Бенгальский залив, Индия <i>Т. К. Барик, С. Н. Суэйн, Б. Саху, Б. Трипатхи, У. Р. Ачарья</i>	617
Первая находка <i>Melamphaes uniformis</i> (Melamphaidae) в юго-западной части Индийского океана <i>А. Н. Котляр</i>	618

Лейкоцитарная формула широколобой нототении <i>Notothenia coriiceps</i> на протяжении годового цикла <i>М. М. Басова</i>	621
Новые данные о двухлинейной камбале <i>Lepidopsetta polyxystra</i> из северо-западной части Берингова моря <i>А. И. Глубоков, С. В. Новикова, П. К. Афанасьев</i>	625
Некоторые особенности биологии сибирского тайменя <i>Hucho taimen</i> (Salmonidae) из бассейна реки Тугур (Хабаровский край) <i>С. Е. Кульбачный, А. В. Кульбачная</i>	629

---



---