

Е33/11
573

П. И. БОГДАН.

К ВОПРОСУ ОЗИМОЙ КУЛЬТУРЫ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В КРЫМУ.

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛА СЕМЕНОВОДСТВА
НАРКОМЗЕМА КРЫМА.

1928

202

633, II

Б-73

П. И. БОГДАН.



III-13197

633
Б-73 II.

6

К ВОПРОСУ ОЗИМОЙ КУЛЬТУРЫ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В КРЫМУ

(ИЗ РАБОТ ОТДЕЛА СЕЛЕКЦИИ КРЫМСКОЙ ОБЛ. С.-Х. ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ).



+

Введение.

В настоящем очерке мы ставим себе целью изложить некоторые данные нашей работы, направленной к отысканию устойчивых в крымских условиях форм твердой пшеницы. Материал для данного очерка составил в результате изучения (по преимуществу ботанического) общекрымских коллекций 1921 и 1924 годов по яровым и в частности по твердым пшеницам, шестилетних посевов коллекции твердых озимых пшениц, переданных нам профессором И. В. Якушкиным и трехлетних работ по сортоизучению и сортоиспытанию твердой пшеницы, проведенных нами при Крымской Опытной Станции. Некоторые сведения заимствованы из весьма скудных литературных данных по культуре твердой пшеницы в Крыму.

Коллекции 1921 и 1924 годов составлены из образцов яровых пшениц, извлеченных из архива бывш. Симферопольской Контрольно-Семенной Станции, а также собранных путем личных экскурсий по Крыму и полученных от хлебозаготовительных контор и местных сельскохозяйственных работников. Общее количество образцов, участвовавших в коллекциях, достигало 107. Коллекции высевались в питомнике Салгирской Опытной Станции (1921 год) и Крымской Опытной Станции (1925 г.).

Для удобства изложения настоящий очерк распадается на две части. Первая часть представляет краткий обзор современного состояния яровой культуры твердой пшеницы, сортового и разнообразного состава ее. Вместе с тем в первую часть нами включены данные об устойчивости отдельных ботанических форм и сортов пшениц яровой культуры. Во второй части изложены данные по озимым твердым пшеницам¹⁾.

Площади и район возделывания.

Несомненно, что многовековая слава зернового Крыма в значительной степени обязана широкому возделыванию здесь в прошлом твердых пшениц. Но уже в 1883 году²⁾ под яровой пшеницей, в том числе и под твердой, насчитывалось всего лишь 4.950 гект., что составляло около 3% посевной площади того года. В дальнейшем, с увеличением запашки, с расширением посевов озимой пшеницы и ярового ячменя яровые пшеницы продолжают утрачивать свое значение. Параллельно

¹⁾ К сожалению, мы не располагаем статистическими данными отдельно по твердым пшеницам. Площади посевов под яровой пшеницей исчислены суммарно для твердой и мягкой пшениц.

²⁾ Памятная книжка Таврич. Губ. Земства, 1889 год.