

ВРАЧ

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал

Издается с мая 1990 года

№ 2

XIX век



XX век



XXI век



Авторитет и традиции — из века в век

- ВИЧ-инфекция:
применение методов генотипирования ВИЧ
и филогенетического анализа
при эпидемиологическом расследовании
- Роль нейрогуморальной активации в развитии АГ
при хронической обструктивной болезни легких
- Изменение трендов в медицинской науке 2014/2015 гг.
- Внутривентрикулярная химиотерапия
в комбинированном лечении
распространенного рака желудка
- Интерстициальное поражение легких
при ревматоидном артрите
- Препараты гиалуроновой кислоты
в лечении остеоартроза
- Терапия сочетанной герпетической
и микоплазменной инфекции у женщин
- Декомпенсация артериальной гипертензии:
пути решения проблемы



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»

www.rusvrach.ru

февраль 2015

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЮБОЙ ЭТИОЛОГИИ

ГАЛАВИТ®

ИННОВАЦИОННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРЕПАРАТ



Клинические эффекты ГАЛАВИТ®

- снижает выраженность воспалительной реакции
- снижает риск развития осложнений воспаления
- сокращает длительность болезни
- способствует стабильной и продолжительной ремиссии
- повышает качество жизни пациентов

ГАЛАВИТ® – ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Показания к применению:

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- хронический рецидивирующий фурункулез
- астенические состояния, невротические и соматоформные расстройства, снижение физической работоспособности (в том числе, у спортсменов)
- острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся интоксикацией и /или диареей
- частые рецидивирующие заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит)

Оптимальная схема лечения «три пятерки» на один месяц

- Первые пять дней по 100 мг/сут ежедневно
- Следующие 10 дней по 100 мг/сут через день
- Следующие 15 дней по 100 мг/сут через каждые 2 дня



Перед назначением препарата следует ознакомиться с инструкцией

