

ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!

№9 (387) май 2016 г.

Читайте в этом номере:

ЛЮБИМЫЕ ЛЕТНИКИ

К типичным однолетникам относятся растения, цикл развития которых ограничивается одним сезоном. Весной их высевают, в течение весны и лета они растут, цветут, дают семена и осенью отмирают.

Наряду с типичными летниками к этой группе относятся и некоторые многолетники, зацветающие в год посева: львиный зев, петуния и др.

Размножают летники в основном семенами. При этом применяют два способа: рассадный и безрассадный. Безрассадный способ прост: семена высевают в открытый грунт сразу на постоянное место. Для некоторых летников этот способ является основным, т.к. они (гипсофила розовая, маки, настурция, годеция, кларкия и др.) плохо переносят пересадку. Это объясняется спецификой развития корневой системы: у них плохо восстанавливаются всасывающие волоски, расположенные на концевых ответвлениях корней, глубоко уходящих в почву.

Наиболее холодостойкие виды однолетников (календула, космея, кларкия, иберис и др.) можно высевать в открытый грунт рано весной, а лучше осенью под зиму. Теплолюбивые виды (портулак, настурция, немезия) следует высевать только весной с таким расчётом, чтобы их всходы не попали под заморозки.

При выращивании летников посевом в открытый грунт растения приобретают большую устойчивость к неблагоприятным погодным колебаниям.

Они легче переносят недостаток влаги и понижение температуры даже до небольших заморозков.

Через рассаду выращивают главным образом

сеют в марте.

В начале мая высевают настурцию, бархатцы.

Мелкие семена (лобелия, портулак, агератум, львиный зев) перед посевом смешивают с мелким песком и слегка присыпают через сито землёй. Семена астр и левкоев засыпают слегка песком, а семена остальных культур – тонким слоем земли, равным толщине семян. Ящики закрывают стеклом и ставят в тёплое место.

После появления всходов ящики переносят в более прохладное место (с температурой 10-15°C), держат при температуре 8-10°C.

Сеянцы агератума, астр, гвоздики Шабо, лобелии, вербены пикируют в пикировочные ящики в стадии первого настоящего листа. Левкои пикируют в торфоперегнойные горшочки, а сеянцы антирринума можно пикировать прямо в грунт.

У многих культур в фазе рассады необходимо провести прищипку главного стебля, чтобы вызвать рост боковых побегов. При этом увеличивается количество цветоносов и продолжительность цветения. Прищипку вербены, гвоздики Шабо, петунии, флокса Друммонда делают, когда у рассады разовьётся 5-6 пар листьев, душистого горошка с 3-4 листьями. У львиного зева прищипывают верхушку в период бутонизации.

Перед высадкой в грунт рассаду несколько дней закаливают, уменьшая полив. После этого рассада легче переносит пересадку.

теплолюбивые (агератум, цинния) и холодостойкие летники с длинным и средним вегетационным периодом: гвоздику Шабо,



вербену, лобелию, астры, антирринум (львиный зев), левкоя, петунию, сальвию, флоксы Друммонда. Семена высевают в ящики. На дно ящика насыпают крупный речной песок слоем 1 см, а поверх него земельную смесь.

Раньше всех (в феврале) высевают гвоздику Шабо, вербену, лобелию и другие растения, у которых от посева до цветения проходит 3-6 месяцев. У агератума, антирринума, астры, левкоя, петунии, сальвии, флокса Друммонда от посева до цветения проходит 2-3 месяца, их

КУЛЬТУРА НОМЕРА: КЛЕМАТИС



НЕОБЫЧНЫЕ ПРИВИВКИ



"СЛАДКА ЯГОДА": ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ СОРТА ЖИМОЛОСТИ



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ЖИМОЛОСТЬ
- САД БЕЗ ХЛОПОТ
- МУХИ - ВРЕДИТЕЛИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель! Получить более ранний урожай овощей можно без дополнительных затрат.

Сначала готовим почвы. Сеять в холодную землю бесполезно: семена только набухнут, но не взойдут, а полежав в таком состоянии несколько дней, они могут просто сгнить. Поэтому ранние овощи лучше выращивать на более высоких местах. Для лучшего прогрева почвы грядку можно накрыть плёнкой. Для ускорения всходов, перед посевом семена нужно замачивать или проращивать. Особенно это касается укропа, петрушки, моркови и лука. После посева грядку можно вновь накрыть плёнкой. Как только появятся всходы, плёнку убирают, иначе растения могут получить ожог.

С уважением, гл. редактор

