

величиной съ куриное яйцо, дающія зыбленіе, причемъ покровы кожи не измѣнены; органы груди здоровы, дых. 26, пульсъ 68; t^0 веч. 37,8, утр. 38,0. Разрѣзомъ той и другой припухлости выпущенъ гной, причемъ въ гнойной полости подъ ключицей прощупываются отломки 2-го праваго ребра; безлихорадочное теченіе, выписался черезъ 19 дней съ заживающими ранами. Въ остальныхъ 4 случаяхъ больные, замѣтивъ улучшеніе, выписались изъ больницы. Кромѣ описанныхъ отдѣльно выше случаевъ, пребываніе въ больницѣ колебалось отъ 6—26 дней. У старика 83 л. съ переломомъ хii и хiii лѣвыхъ реберъ на 20 день получилось полное сращеніе. Лѣченіе—повязка изъ полотна и липкаго пластыря.

Переломъ плеча (*fract. humeri*) отмѣчено 6 случаевъ: 3 раза на правомъ плечѣ и столько же на лѣвомъ. Въ одномъ случаѣ былъ также одновременно переломъ предплечья. 5 выписались выздоровѣвшими черезъ 25—60 дней; 1 съ улучшеніемъ, такъ какъ пожелалъ лѣчиться амбулаторно. Лѣченіе: повязка Дезо, массажъ.

Переломы обѣихъ костей предплечья (*fract. antibrachii*) наблюдались въ 5 случаяхъ, изъ нихъ въ одномъ былъ одновременно переломъ плеча, какъ упомянуто выше. 3 раза повреждено было правое предплечье и 2 раза—лѣвое. 1 выписался черезъ сутки для амбулаторнаго лѣченія; прочіе оставались до выздоровленія (28—39 дней). Лѣченіе: крахмально-шинная повязка, массажъ.

Переломовъ лучевой кости (*fract. radii*) было 4 случая, всѣ на лѣвой рукѣ. Переломъ около шиловиднаго отростка далъ выздоровленіе черезъ 17 дней; другой въ серединѣ луча—черезъ 29 дней. Остальные двое выписались съ улучшеніемъ.

Переломъ локтевой кости (*fract. ulnae*), правой у одного больного, который выписался черезъ 6 недѣль выздоровѣвшимъ.

Переломъ малоберцовой кости (*fract. fibulae*) наблюдался у 5 мужчинъ и 2 женщинъ (5 *fib. dex.* и 2 *f. sin.*). Изъ нихъ въ 6 случ. былъ надмыщелковый переломъ; въ 1 случ. на границѣ нижней и средней третей. Лѣченіе—покойное положеніе въ проволочной шинѣ и ранній массажъ. Больные начали приступать съ 13—20 дня, выздоровленіе черезъ 20—28 дней. Въ 1 случ., сопровождавшемся значительн. *distorsio* голеностопнаго сустава больной выписался здоровымъ черезъ 37 дней.

Переломовъ обѣихъ костей голени (*fract. cruris*) 5 (3 на лѣвой голени, 2 на правой). При переломѣ въ нижней трети, безъ смѣщенія, больной сталъ приступать съ 21 дня, ходить свободно черезъ 28 дней. Въ трехъ случ. выздоровленіе отмѣчено черезъ 45 дней. Лѣченіе—положеніе конечности въ проволочной шинѣ и массажъ. Въ 5 случаѣ имѣлся косоі переломъ въ средней трети голени, со значительнымъ смѣщеніемъ отломковъ; лѣченіе было комбинированное: 4 гипсовые по-

вязки по 2 недѣли и массажъ въ промежутки между ними; началъ приступать съ 116 дня, выписался черезъ 135 дней, свободно пользуясь конечностью.

Переломовъ бедра (*fract. femoris*) отмѣчено 7 (5 мужч. и 2 женщ.; 4 лѣваго бедра и 3 праваго). Изъ нихъ одинъ въ шейкѣ лѣваго бедра у 61 л. субъекта съ поперечнымъ переломомъ надколѣнной чашки; сращеніе надколѣнника черезъ 6 недѣль, получилось укороченіе 2 *cm.*; сталъ приступать черезъ 50 дней; выздоровленіе черезъ 84 дня. Въ другомъ случаѣ переломъ произошелъ надъ колѣнныхъ суставовъ; получилось укороченіе 2 *cm.*, сталъ пользоваться ногой съ 90 дня. Остальные переломы наблюдались въ срединѣ и на границѣ нижней и средней третей бедра; позволено приступать на 23 день (дѣвочка 6 лѣтъ) и на 35—60 (взрослымъ) день. Лѣчение—шинная повязка съ вытяженіемъ, массажъ.

Переломъ носовыхъ костей (*fract. oss. nasi*) отмѣченъ 1 разъ; выписался съ улучшеніемъ для амбулат. лѣченія.

Переломъ шейнаго позвонка наблюдался 1 разъ; больной упалъ съ 2 саж. высоты: въ полномъ сознаніи, острая боль въ нижнихъ шейныхъ позвонкахъ; параличъ движенія въ конечностяхъ и туловищѣ; дых. 24 исключительно при помощи діафрамы, такъ какъ дыхательныя мышцы груди и брюшныя парализованы; параличъ мочевого пузыря и кишекъ; анестезія конечностей и туловища, за исключеніемъ верхней части груди и плечъ. Больной прожилъ менѣе 1½ сутокъ.

Осложненные переломы наблюдались у 22 больныхъ (19 мужч. и 3 женщ.).

1) Переломы пальцевъ (*fract. compl. digitorum*) отмѣчены у 11 чел.; изъ нихъ въ 6 случаяхъ повреждена была правая рука, 3 случ. приходится на долю лѣвой и 2—лѣвой ноги. Всѣ поврежденія кончились выздоровленіемъ; 7 случаевъ изъ общаго числа упомянуты въ оперативномъ отчетѣ, такъ какъ потребовалась ампутація пальцевъ.

2) Переломы обѣихъ костей предплечья (*fr. compl. antibrachii*) (1 мужч. и 1 жен.). У послѣдней черезъ 46 дней отмѣчено полное выздоровленіе; мужчина же доканчивалъ лѣченіе амбулаторно.

3) Переломы плеча (*fr. compl. humeri*)—2 на правой рукѣ. У одного больного существовать единовременно вывихъ поврежденнаго плеча—черезъ 66 дней получилось полное возстановленіе функціи руки. О другомъ больномъ упомянуто въ оперативномъ отчетѣ.

4) Переломъ обѣихъ костей голени (*fr. compl. cruris*) у 3 мужч. и 1 женщ. 1 случай потребовалъ ампутаціи (см. опер. отч.). Въ другомъ случаѣ больной сталъ пользоваться конечностью съ 53 дня. Остальные двое выписались по собственному желанію съ улучшеніемъ, для лѣченія на дому.

5) Переломъ в. челюсти (fr. compl. maxillae super.) окончился выздоровленіемъ въ 26 дней.

6) Переломъ носов. костей—1, выписался съ улучшеніемъ.

7) Переломъ нижней челюсти (fr. maxillae inf.) въ 1 случаѣ. Глубокая рана въ 11 см. длиной на правой щекѣ, переломъ вѣнечнаго отростка; развился гнойный затекъ на шеѣ; выздоровленіе черезъ 67 дней.

В ы в и х и (Luxationes). Вывихи плеча наблюдались 5 разъ (4 м. и 1 ж.): въ 4 случ. имѣлся lux. subcoracoidea, въ пятомъ же задній видъ вывиха. Всѣ случаи были свѣжаго происхожденія, только въ 1 случ. вывихъ существовалъ 3 недѣли; вправленіе преимущественно физиологическимъ способомъ. Вывихъ локтя (задній видъ) и бедра (lux. obturatoria) отмѣчены по 1 разу, вправленіе по физиологич. способу. 1 случ. приходится на вывихъ надколенной чашки кнаружи, выздоровленіе. Осложненный вывихъ наблюдался 1 разъ: рана съ внутренней стороны, проникающая въ голеностопный суставъ, загрязнена; стопа смѣщена кнаружи; образовалась быстро флегмона клетчатки голени и частью бедра, что потребовало нѣсколькихъ широкихъ разрывовъ; получился анкилозъ голеностопн. сустава, больной сталъ ходить.

Р а с т я ж е н і е с у с т а в а (distorsio) занесено дважды; въ правомъ коленномъ суставѣ и въ лѣвомъ голеностопномъ. Выздоровленіе.

Остается упомянуть о 19 больныхъ, которые не могутъ быть подведены подъ упомянутыя рубрики. 6 случаевъ относятся къ ущемленнымъ грыжамъ, которыя вправились при примѣненіи теплыхъ ваннъ. inj. morphii, клизмы; больные—всѣ мужчины (1 изъ нихъ поступилъ въ теченіе года 2 раза); возрастъ больныхъ колебался отъ 28 — 76 л., всѣ грыжи были паховыя (по 3 случая на правую и лѣвую сторону); больные выписаны съ бандажами. Слѣдующихъ заболѣваній было по 2 случая: суженіе уретры послѣ триппера (бужированіемъ восстановлено свободное мочеиспусканіе), острый ревматизмъ, ригидность суставовъ, флегмона подкожной клетчатки. По 1 случаю наблюдались: періоститъ вълѣдствіе caries dentis (извлеч. корней), спондилитъ (больной 10 лѣтъ назадъ лежалъ въ отдѣленіи по поводу спондилита 8, 9 и 10 грудн. позвонк.; въ послѣднее время замѣтилъ появленіе параличей нижнихъ конечностей; было примѣнено вытяженіе на наклонной плоскости, затѣмъ корсетъ—больной сталъ свободно ходить), натечный нарывъ (послѣ спондилита), остеоміелитъ верхней части tibiae (больному была сдѣлана частичная резекція въ Харьковѣ, лѣченіе докончилъ въ нашемъ отдѣленіи—раны зарубцевались, больной сталъ ходить безъ костылей, причемъ въ коленномъ суставѣ получился анкилозъ), трещина ani.

Штатный ординаторъ Н. П. Балкашинъ,
Сверхштатн. ординаторъ С. П. Полтановъ.

Отчетъ по II хирургическому отдѣленію за 1896 г.

За истекшій 1896 годъ во II хирургическомъ отдѣленіи пользовано 659 больныхъ, изъ коихъ 464 мужчинъ и 195 женщинъ; выписано совершенно здоровыми 401; съ улучшеніемъ, по собственному желанію 217; безъ улучшения 15 умерло 26, т. е. $\frac{0}{100}$ смертности менѣе 4%. Большую часть больныхъ составляютъ поврежденные тѣмъ или инымъ способомъ (341); страдавшіе флегмонознымъ воспаленіемъ (95), одержимые болѣзнями суставовъ и костей, главнымъ образомъ характера туберкулезнаго; этого рода больные въ большинствѣ пользованы были на ходу, особенно въ лѣтнее время, пользуясь больницею только въ крайнихъ случаяхъ.

М ѣ с я ц ы.	Мужчинъ.	Женщинъ.
Январь	32	16
Февраль	28	15
Мартъ	32	20
Апрѣль	34	18
Май	44	23
Іюнь	43	24
Іюль	49	18
Августъ	45	9
Сентябрь	36	16
Октябрь	40	6
Ноябрь	38	16
Декабрь	43	14
И Т О Г О . .	464	195
	659	

I гр. Поврежденія механическаго происхожденія.

Переломы осложненные и простые въ числѣ 59: изъ коихъ 50 мужчинъ и 9 женщинъ, осложненныхъ переломовъ 32; всѣ больные

мужчины; главнымъ образомъ поврежденія на костяхъ рукъ; получены во время исполненія работы (21); поврежденія состояли въ раздробленіи одного или нѣсколькихъ пальцевъ, были осложнены у нѣкоторыхъ нагноительнымъ процессомъ (въ еще больницы); даѣе по большинству осложненные переломы приходится на голень 6, эти поврежденія также тяжелыя; переломъ плечевой кости 3, ключицы и стопы по 1-му; почти все больные выписались здоровыми. Одинъ изъ больныхъ имѣлъ fracturam cranii, доставленъ въ безсознательномъ состояніи, получивъ въ дракѣ ударъ по головѣ полѣномъ и ударившись объ мостовую; рана у затылочнаго бугра въ 4 сант. длиною, проникала до кости, на которой видна трещина; первое время былъ въ сильно возбужденномъ состояніи, прыгалъ, метался изъ стороны въ сторону; отправления имѣлъ непроизвольно; первые дни страдалъ рвотою; черезъ недѣлю сталъ покоемъ, но ослабѣлъ. Черезъ 2 недѣли отъ поступленія сталъ разговаривать (ранѣе только мычалъ) и появилось стремленіе уйти домой; отправления стали произвольны; такимъ образомъ пробылъ дня 3, за симъ опять пришелъ въ возбужденіе; чрезъ 4 недѣли сталъ покоенъ; началъ ходить, но пошатываясь; узнать пришедшихъ родственниковъ, но все время настоятельно просилъ его выписать. Выписанъ чрезъ 50 дней съ поджившею раною при хорошемъ состояніи здоровья; все помнить, кромѣ событія, какимъ образомъ онъ получилъ поврежденія.

Мѣсто перелома.	Пользо- валось.		Выдору- влено.		Выпис. съ улучшен.		Умерло.		З а м ѣ ч а н і я .
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Рёбра	5	4	4	3	1	1	—	—	Поврежденія получены главнымъ образомъ отъ побоевъ и паденія. У одной больной изломано 3 ребра; у 3 по 2 ребра и 5 по 1 ребру. Лѣчение состояло въ наложеніи повязки изъ широкаго полотна или липкаго пластыря. Выписались въ среднемъ чрезъ недѣлю.
Бёдра	1	1	1	—	—	1	—	—	У 1 больного переломъ въ верхней трети бедренной кости; выписанъ здоровымъ; у 1 больной былъ застарѣлый 4 мѣсячный переломъ шейки бедра. Переведена была изъ женскаго отдѣленія; выписана съ улучшеніемъ.
Подвздошной кости	—	1	—	—	—	1	—	—	Больная получила поврежденія отъ ушиба лошадыю; переломленъ край подвздошной кости, затруднена ходьба. Кромѣ перелома на всемъ тѣлѣ были глубокіе кровоподтеки, а по лѣвой голени и бедру кровоподтеки мелкіе и поверхностные.