

А

ОБЗОРЪ СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ за 1894 годъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ВСЕПОДАДАНЪЙШЕМУ ОТЧЕТУ ВОЕННАГО ГУБЕРНАТОРА,



ТАШКЕНТЪ.
ТИПО-ЛИТОГРАФИЯ Т. Д. „В. И Г. БР. КАМЕНСКІЕ“
1897.

А

Печатано по распоряженію военнаго губернатора Сыръ-Дарьинской области.



2004175336

ОТДѢЛЪ I.

Естественныя и производительныя силы
области и экономическая дѣятельность ея
населенія.

З Е М Л Е Д Ъ Л І Е.

Зима отчетнаго года отличалась незначительнымъ выпаденіемъ осадковъ и довольно постоянными морозами. Первые изъ нихъ наблюдались 19 ноябрю предшествовавшаго года и наступили послѣ мягкихъ осеннихъ дней. Съ этого времени температура не повышалась: 2 января стала р. Сыръ-Дарья у сел. Чиназъ. Однако, суровое дѣйствіе зимы продолжалось лишь до 6 февраля, къ каковому времени въ южной части области рѣки очистились отъ льда.

Наступившая затѣмъ весна сначала подавала большія надежды на совершенно благополучный исходъ цвѣтенія плодовыхъ деревьевъ и прозябанія яровыхъ посѣвовъ; но къ десятиымъ числамъ апрѣля воздушная температура стала замѣтно понижаться, а въ ночь съ 12 на 13 число того же мѣсяца выпалъ снѣгъ, и ртуть въ термометрѣ опустилась ниже нуля. Явленіе это наблюдалось на всей территоріи области.

Плодовые завязи были побиты, виноградники потеряли цвѣтъ, хлопокъ во многихъ мѣстахъ приходилось пересѣивать; выкормка шелковичныхъ червей стала затруднительна, такъ какъ тутовникъ также пострадалъ отъ мороза.

Со второй половины апрѣля температура стала повышаться, а вмѣстѣ съ тѣмъ наступило бездождіе, длившееся цѣлый мѣсяцъ; на озимыхъ посѣвахъ засуха отразилась не особенно вредно, яровые же хлѣба сильно переболѣли. Однако, майскій дождь поправилъ дѣло, и урожай хлѣбовъ вышелъ удовлетворительнымъ.

Пониженная т-а марта мѣсяца задержала таяніе снѣговъ въ горахъ, а потому уровень водъ въ рѣкахъ долго не повышался, и нѣкоторые ирригаціонные каналы продолжительное время бездѣйствовали.

Руслѣ р. Аму-Дарьи близъ г. Петро-Александровска сильно уклонилось влѣво, и головы главныхъ арыковъ остались на сухомъ берегу. Въ предупрежденіе засухи, пришлось устраивать запруды въ протокахъ рѣки, и такимъ же способомъ направить воду къ культурнымъ полямъ.

Вышеописанныя условія весенняго періода отразились на яровыхъ (богарныхъ) поляхъ неблагоприятно. Во многихъ мѣстахъ урожаи богарной пшеницы были гораздо ниже среднихъ нормъ. Озимыя же поливные поля дали урожаи хорошіе.

Тѣ же неблагоприятныя условія весенняго періода задержали ростъ травъ, которыя, съ наступленіемъ теплыхъ дней, хотя и стали поправляться, но для полного развитія у нихъ уже не оставалось того времени, которое требуется. Поэтому наступившая лѣтняя жара не дала травамъ достигнуть обычнаго роста. Первый сѣвъ люцерны съ поливныхъ полей вышелъ весьма скуднымъ.

Въ Ташкентскомъ, Казалинскомъ и Перовскомъ уѣздахъ появлялась саранча. Благодаря успѣшной борьбѣ съ этимъ насѣкомымъ въ предшествующемъ году, особеннаго вреда хозяевамъ области она не причинила.

Кое-гдѣ въ Чимкентскомъ уѣздѣ на хлѣбныхъ поляхъ появлялся жукъ „конгузъ“, но въ ничтожномъ количествѣ.

Среднія цифры урожая хлѣбовъ въ отчетномъ году приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Названія хлѣбовъ.	С А М Б.						
	Ташкент-скій уѣздъ.	Чимкент-скій уѣздъ.	Перовскій уѣздъ.	Казалин-скій уѣздъ.	Аулиеатин-скій уѣздъ.	Аму-Дарьинскій от.	Въ обла-сти.
Озимая пшеница.	5,3	3,85	6	5	5,9	10,2	4,54
Яровая	7,3	3,57	7,4	5	3,4	12,1	6,54
Ячмень	7,4	4,57	8,7	5,72	3,3	9,2	6,53
Просо	18	10,23	28	9,3	37	58	26,75
Рисъ	9	—	—	—	—	15,7	12,35
Кукуруза . . .	7,6	19,4	—	—	—	113	70
Джугара . . .	22,5	8	—	—	3	—	11,1

Количество посѣяннаго и снятого хлѣба видно изъ слѣдующей таблицы.