

№ 41.

M - 149

АНТРОПОЛОГИЧЕСКІЕ МАТЕРІАЛЫ. Часть 2. Вып. 6.

ЧЕРЕПА

СИБИРСКИХЪ ИНОРОДЦЕВЪ,

НАХОДЯЩІЕСЯ ВЪ КРАНІОЛОГИЧЕСКОМЪ СОБРАНІИ ОБІЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ.

А. Л. Богданова.

MOCKBA.

Типографія М. Н. Лаврова и К[®], Леонтьевскій пер., д. № 14. 1879.



M 149

VI.

BREJHOTERA HMOHN B.E. JEMMA 17008-46

Черепа Сибирскихъ Инородцевъ.

Восточно-Сибирскій Отділь Императорскаго Географическаго Общества неоднократно доставляль нашему Обществу серіи череповъ, принадлежащихъ Сибирскимъ инородцамъ, кон до настоящаго времени не были еще описаны. Такъ какъ серін эти малы, то дёлать какіе либо окончательные выводы изъ нихъ нельзя, но какъ матеріаль для дальнъйшаго изученія они весьма цэнны, тэмь болье, что принадлежать племенамь, относительно которыхъ существуетъ сравнительно немного данныхъ. Въ виду этого, а также необходимости имъть по возможности больше измфреній на черепахъ различныхъ племенъ для болье общей, подготовляемой мною, работы, я н представляю Обществу этоть небольшой очеркъ краніологическихъ данныхъ, имфющихся у насъ череповъ, въ видф продолженія каталога нашего Собранія. Собраніе это постоянно увеличивается и если последовательно не разработывать его, то затымь потребуется слишкомь продолжительное время для возможности описанія его.

1. Якутскіе черепа. Ихъ всего два въ нашемъ собраніи.

1) Мужской. Glabella сильно развита. Черепъ широкій, зубы стерты, швы сросшіеся. Темя плоско округленное, затылочная часть невыдающаяся. Мѣсто прикрѣпленія

затылочныхъ мускуловъ сильно развито.

2) Мужской. Надбровныя дуги развиты, лобь отлогій и по срединѣ килеобразенъ. Темя приподнятое, затылокъ мало выдающійся. Мѣста прикрѣпленія мускуловъ въ височной части сильпо выражены. Сростаніе замѣчается на темянномъ и вѣнечномъ швахъ, а на затылочномъ только начало сростанія.

Измѣренія слѣдующія (у втораго черепа нѣкоторыя измѣренія взяты только приблизительно):

			1.	2.
1.	A.	Горизонтальная окружность	530	514
2.	a.	Лобная часть горизонтальной ок-		
		ружности	240	245
3.	nclf.	Вертикальная окружность	371	-
4.	nc.	Лобная часть ея	130	128
5.	cl.	Темянная часть ея	123	-
6.	lf.	Затылочная часть ея	118	_
7.	1T.	Верхняя часть затылочной дуги.	66	-
8.	Tf.	Нижняя часть ея	52	_
9.	bf.	Длина затылочнаго отверстія	38	-
10.	qq.	Ширина затылочнаго отверстія.	28	_
11.	nb.	Основная линія	110	102
12.	OPO.	Поперечная окружность	310	308
13.	OPO+00.	Цёлая поперечная окружность	490	470
14.	00.	Ушной діаметръ	140	138
15.	L.	Продольный діаметръ	188	180
16.	Q:	Поперечный діаметръ	150	150
17.	H.	Высотный діаметръ	141	_
18.	0101.	Височный діаметръ	147	150
19.	FF.	Наибольшій лобный	120	-
20.	F_1F_1 .	Наименьшій лобный	103	92

-	21.	SS.	Затылочный поперечный	121	130
	22.	γ.	Внутренній глазнич. діаметръ	105	104
5	23.	γ1.	Внѣшній глазничный	115	111
T A	24.	γ2.	Щечный (разстояние срединъ ску-		
1			ловыхъ костей)	122	120
	25.	γ3.	Скуловой, разстояніе внѣшнихъ		
			угловъ скуловыхъ костей	127	130
	26.	γ4.	Наибольшій лицев., поперечный.	145	150
	27.	nx ₁ .	Разстояніе носовой точки до		
1			челюст, или длина лицев, части	81	_
	28.	XX.	Разстояніе подносовой точки отъ		
			челюстной	18	_
	29.	Y.	Высота скуловой кости	31	26
	30.	D_1 .	Ширина глазницъ	39	41
01111	31.	D.	Высота глазницъ	34	36
	32.	T.	Межглазничное пространство	28	30
	33.	nx.	Длина носа	63	60
	34.	r.	Ширина носа	28	31
-	35.	M.	Длина неба	56	49
1	36.	M ₁ .	Ширина неба	43	43
	37.	N.	Разстояніе края неба отъ перед-		
1000			няго края затылоч. отверстія.	46	41
	38.	θ	Высота сосцевидныхъ отростковъ	43	28
1	39.	OZ	Разстояніе отъ слуховаго отвер-		
			стія до задняго края глазн	77	79

"Якуты *), считаемые за принадлежащихъ къ татарской вътви, называютъ себя сами "Сахаларъ" отъ сахаларскихъ татаръ. Они сохранили татарское наръчіе въ его первоначальной, хотя и грубъйшей, формъ. Этому способствовало и то, что Якуты единственное татарское племя, не обращенное въ исламъ, имѣвшій всегда большое вліяніе на видоизмѣненіе татарскихъ языковъ. Якуты, въ числѣ 80,000, разсилены по громаднымъ пространствамъ обоихъ береговъ Лены, приблизительно отъ 600 до Ледовитаго океана п при своихъ странствованіяхъ доходять на Западъ до Хашанги, а на Востскъ до области Чукчей, т. е. за 1500 В. Д. (отъ Парижа). Большая часть этого обширнаго пространства стоить надъ вліяніемъ самыхъ ужасныхъ условій полярной природы. Въ Якутскъ средняя годовая темнература—8,25°R., тогда какъ у Березова она только —3,4°, а у Архангельска +0,6°. Въ Якутскъ почва оттанваетъ къ концу лъта только до глубины $3^{1}/_{2}$ — $4^{1}/_{2}$ футовъ; ниже лежитъ никогда не таящій слой льда, такъ что въ Якутскъ въ ледникахъ домовъ все жидкое можеть замерзать даже въ самые жаркіе зътніе мъсяцы въ теченін двухъ часовъ. Короткое льто можеть быть однако же теплымъ и средняя температура іюля доходить до+16,350 К.; бывають лѣтніе дни, въ коихъ термометръ доходить до +360. Южнъй часть этой области покрыта

^{*)} Cm. Ethnographie Russlands nach Rittich, Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischen Anstalt. Ergänzungsheft № 54, crp. 25.