

* * *

О ВСТРЕЧАХ В КАЛМЫКИИ МОРЯНКИ, ОБЫКНОВЕННОГО ФЛАМИНГО И ЧЕРНОЗОБОЙ ГАГАРЫ

В.М. Музаев¹, О.В. Сидоров², В.Э. Бадмаев², Б.Н. Убушаев²

¹Калмыцкий государственный университет, г. Элиста

²Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия, г. Элиста

Морянка (*Clangula hyemalis*). Арктический вид с циркумполярным гнездовым ареалом. В России обитает по берегам озер и рек по всей тундровой и лесотундровой зонам; зимует в основном на незамерзающих морях северо-запада России и Дальнего Востока (Иванов, 1976; Степанян, 1990; Беме и др., 1996).

На водоемах Северного Кавказа встречается крайне редко в периоды миграций и зимовок (Казаков, 2004). К их числу относятся и водоемы Кумо-Манычской системы, одним из которых является расположенное в долине Западного Маныча, на границе Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края, оз. Маныч-Гудило. Первые сведения о встречах морянки на этом водоеме, причем довольно массовых, относятся к середине 1970-х гг. Так, осенью 1975-1976 гг. с конца сентября-начала октября здесь учитывали до 0,6 тыс. особей, а во второй половине марта 1977 г. в общей сложности отмечено около 1,4 тыс. птиц (Лысенко, 1977; Гаврин и др., 1980; Линьков и др., 1980; цит. по Белик, 2004). Однако, по мнению Б.А. Казакова (2004), вышеприведенные количественные данные требуют уточнения. Следующая встреча морянки на Маныче-Гудило имела место лишь весной 2004 г.: 8 птиц держалась с 3 по 8 мая в устье залива б. Хоревой (Пролетарский р-н Ростовской области) (Белик, 2004). Еще одним водоемом Кумо-Манычской системы, на котором зарегистрированы документально встречи морянки, является расположенное в долине Восточного Маныча, на границе Калмыкии и Ставропольского края, Чограйское водохранилище. 25-27 ноября 1973 г. Б.П. Савицким (1974) в Ики-Бурульском

р-не Калмыкии в прилётной части водохранилища дважды встречены стайки этой утки из 6 и 19 птиц, из которых 27 ноября был добыт взрослый самец в зимнем наряде. Заслуживает внимания тот факт, что один из опрошенных им охотников, которым была показана добытая птица, указал, что встречал таких уток осенью 1972 г. на Состинских озерах, расположенных в 50-60 км восточнее Чограйского водохранилища. 13 ноября 2009 г. одним из охотников в хвостовой части этого водохранилища (недалеко от п. Зунда-Толга Ики-Бурульского р-на) была добыта молодая птица (рис. 1).



Рис. 1. Морянка, добытая охотниками на Чограйском водохранилище

Обыкновенный фламинго (*Phoenicopterus roseus*). Распространен в тропических и субтропических регионах Европы, Африки и Азии, где поселяется отдельными колониями, как правило, на топких илистых или песчаных труднодоступных островах и отмелях обычно сильно соленых озер и морей (Джамирзоев, Машына, 2011). В бывшем Южном федеральном округе этот вид лишь для Дагестана считается случайно зимующей, пролетной птицей, на остальной же территории его появление носит характер нерегулярных залетов (Казаков, 2004; Белик и др., 2006; Федосов, Маловичко, 2006). В Калмыкии фламинго очень редкий залетный вид, встречи которого до последнего времени ограничивались в основном водоемами Кумо-Манычской системы. Дважды он отмечен в Яшалтинском районе близ с. Соленое: в октябре 1981 и 1985 гг. 1 и 5 птиц, соответственно (Хохлов, 1988; цит. по Казаков, 2004), еще дважды – в Черноземельском районе на Состинских озерах: 50 птиц в конце октября 1985 г. (Хохлов, 1988; цит. по: Казаков, 2004) и одиночная птица в 1987 г. (дата встречи не указана) у п. Ачинеры (Близнюк, 2004), также 2 раза – в Приютненском районе: 2 декабря 2007 г. одиночная молодая птица на южном рукаве оз. Маныч на мелководье у берега Левого Острова (Цапко, 2008), в мае 2009 г. стая на северном берегу оз. Маныч-Гудило на юго-запад от с. Приютное (устное сообщение охотника Б.И. Убушаеву). По опросным данным, полученным Б.И. Убушаевым,