

MÉLANGES BIOLOGIQUES

TIRÉS DU

BULLETIN

DE

L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST.-PÉTERSBOURG.

TOME IX.

LIVRAISONS 1 ET 2.

(Avec 2 Planches.)

ST. - PÉTERSBOURG, 1873.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des Sciences:

A ST.-PÉTERSBOURG:

MM. Eggars & C°, H. Schmitzdorff, J. Issakof et A. Tcherkessoff.

A RIGA:

M. N. Kymmel.

A ODESSA:

A. E. Kochribardshi.

A LEIPZIG:

M. Léopold Voss.

Prix: 85 Cop. arg. = 28 Ngr.

Imprimé par ordre de l'Académie Impériale des sciences.
Décembre 1873. C. Vessélofski, Secrétaire perpétuel.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences.
(Vass.-Ostr., 9^e ligne, № 12.)

C O N T E N U.

	Pages.
C. J. Maximowicz. Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae. Decas tertia decima. (Cum 1 tabula.)	1— 30
——— Decas quarta decima.....	31— 71
——— Bericht über die dritte Zuerkennung des Baer'schen Preises.....	72—110
J. F. Brandt. Über bisher in Russland gefundene Reste von Zeuglodonten	111—112
——— Einige Worte über die Eintheilung der Zahnwale (Odontoceti).....	113—116
Dr. K. E. v. Baer. Biographische Nachrichten über den Embryologen Grafen Ludwig Sebastian Tredern..	117—130
Prof. A. Famintzin. Die Wirkung des Lichtes auf die Zelltheilung	131—147
C. J. Maximowicz. Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae. Decas quinta decima.....	148—188
J. F. Brandt. Über die bisher in Russland gefundenen Reste untergegangener Cetaceen	189—197
Ph. Owsiannikow. Über die ersten Vorgänge der Entwicklung in den Eiern des <i>Coregonus lavaretus</i> . (Mit einer Tafel).....	198—212
C. J. Maximowicz. Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae. Decas sexta decima.....	213—270

28 Novembre
10 Décembre 1872.

Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae. Scripsit C. J. Maximowicz.

DECAS TERTIA DECIMA.

Anemone nikoënsis. (*Anemonanthea*) rhizomate carnosō tenui horizontali; foliis ciliatis: radicalibus longe petiolatis subtriteratidisectis, segmentulis terminalibus tripartitis pinnatifidisque, lateralibus pinnatifidis, lacinulis lanceolatis incisis; involucralibus 3 petiolatis, petiolo basi vaginato-dilatato lamina triplo breviore, trisectis, segmentis cuneato-ovatis acutis terminali longe lateralibus brevissime petiolulatis pinnatipartitis, laciniis divergentibus pinnatifidis, lacinulis lanceolatis; pedunculo solitario (rarissime binis) involucrum duplo superante piloso apicem versus lanato-villoso; petalis extus pubescentibus albis ovalibus; carpidiis (sub anthesi) sessilibus anguste ovoideis dense lanatis stylo glabro brevi superatis, receptaculo semi-globoso. — *A. nemorosa*. *Itchirin-soo*. Soo bokf. X. 32.

Hab. in *Nippon* mediae alpe altissima Nikkoo (Tschenoski flor. 1864). Colitur rarius in urbe Yedo, Aprili florens (Dr. Savatier! 1869).

Ex affinitate *A. umbrosae*, C. A. Mey., a qua tamen,