

одному удержать вправленный вывихъ не было возможности, ибо головка вывихнутой ключицы изъ сустава ея съ грудиною постоянно выходила; свободно двигалъ верхнюю конечностью; вывихи у 3 больныхъ сопровождались ранами и обширными ушибами, полученными отъ побой; въ 2 случаяхъ вывихи были застарѣлые—6 недѣльные и вправление произведено подѣ хлороформнымъ наркозомъ. Вывихи у 6 больныхъ въ плечевомъ суставѣ; по одному вывиху пришлось на тазобедренный и грудно-ключичный суставы. Въ больницу помѣщались болѣе тяжелые больные; значительное большинство вправлено на ходу (смот. отчетъ по хирургической амбулатории).

Растяженіе суставовъ у 10 больныхъ; все мужчины; поврежденіе получено ими отъ паденія, удара и въ одномъ случаѣ отъ прыжка со 2-го этажа; главнымъ образомъ пострадалъ голеностопный суставъ, на который приходится 8 случаевъ; по одному падаетъ на коленный и тазобедренный суставы. Два послѣдніе представляли болѣе тяжелое поврежденіе, пролежали около 2-хъ недѣль, остальные выписались черезъ нѣсколько дней; все помѣчены выздоровѣвшими; лѣченіе состояло въ массажѣ.

II группа. Болѣзни термическаго происхожденія.

Больные съ ожогомъ, въ виду продолжительнаго нагноенія, иногда омертвѣнія покрововъ помѣщаются во второе хирургическое отдѣленіе, и только за неизмѣнимъ мѣста въ немъ попадаютъ въ 3-й баракъ. Поэтому больныхъ съ ожогомъ было въ отдѣленіи только 3, двое мужчинъ и ребенокъ. У всехъ была ожога I и II степеней; разбросана главнымъ образомъ по открытымъ частямъ тѣла и захватывала менѣе $\frac{1}{3}$ поверхности туловища. Все выздоровѣли.

III группа. Болѣзни суставовъ.

Всего больныхъ различными формами заболѣванія большихъ суставовъ и слизистыхъ сумокъ было 15; изъ нихъ 10 выздоровѣло; выписано съ улучшеніемъ 3; безъ улучшенія 2.

На почвѣ ревматической повторное заболѣваніе въ какомъ либо суставѣ было у 4 больныхъ; поступали больные съ незначительно повышенной t^0 , опухлостью и сильной болѣзненностью сустава, невозможностью пользованія имъ, а нѣкоторые со сведеніемъ, какъ напримѣръ коленного сустава; послѣ ваннъ, массажа и электризаціи получалось улучшеніе; все выписаны здоровыми.

Острое серозное воспаленіе коленного сустава наблюдалось у 4 больныхъ, въ среднемъ возрастѣ, появлялось обыкновенно повторно, послѣ продолжительнаго усиленнаго движенія; скопле-

ніе въ суставахъ и въ заворотахъ его доходило до значительныхъ размѣровъ; въ общемъ состояніе здоровья этихъ больныхъ было ниже средняго; послѣ покоя, массажа и ваннъ наступало облегченіе; выписаны, будучи въ состояніи свободно ходить.

Хроническое серозное воспаленіе колѣннаго сустава у одного; сдѣлана операція (смот. оперативн. отчетъ); выздоровѣлъ.

Туберкулезное пораженіе суставовъ у 4 больныхъ; въ 3 случаяхъ захваченъ колѣнный суставъ, въ одномъ локтевой; 2 больныхъ послѣ продолжительной неподвижной повязки получили улучшение, одинъ отправленъ въ деревню безъ улучшения, въ виду слабого общаго состоянія здоровья; послѣднему сдѣлана операція выскребанія и промываніе сустава. Ему предварительно поднадкостнично впрыскивался хлористый цинкъ; получилось улучшение, сталъ ходить съ палкою и выписался для лѣченія въ деревнѣ, ибо отмѣчено было помимо колѣннаго сустава, туберкулезное пораженіе въ другихъ частяхъ тѣла, какъ-то: на ребрахъ и бедрахъ (см. оперативный отчетъ).

Hygroma, у одного больного; сдѣлана операція; выписанъ здоровымъ. Bursitis, у одной больной; сдѣлана ignipunctura; выздоровѣла.

IV группа. Болѣзни костей.

Одержимыхъ различными болѣзнями костей было 15. Изъ нихъ съ омертвѣніемъ костей было 8, мужчинъ 5 и 3 женщины; у пяти было поражено омертвѣніемъ бедро, послѣ остеоміелита, у 2 нижнія челюсти отъ каріозныхъ зубовъ и у одной теменная кость послѣ бывшаго раненія черепа топоромъ. Операція секвестротоміи сдѣлана 5 (см. оперативн. отчетъ); двое отказались отъ операціи и нынѣ лѣчатся перевязками амбулаторно; одинъ оправился совершенно при амбулаторномъ лѣченіи, секвестръ выдѣлился самопроизвольно.

Туберкулезное пораженіе костей у 7 больныхъ; 5 мужчинъ и 2 женщины; 6 имѣли пораженіе въ грудной части позвоночника; одна больная голени и бедра, гдѣ особенно часто появлялись у нея сильныя боли съ повышеніемъ t^0 .

Одержимые туберкулезомъ позвоночника, всѣ имѣли рѣзкое искривленіе кзади (kyphosis); кромѣ того въ одномъ случаѣ пораженъ былъ тазобедренный суставъ, отъ чего произошло рѣзко выраженное укороченіе конечности; всѣ болѣли въ теченіи многихъ лѣтъ; нѣкоторые уже имѣли параличъ нижнихъ конечностей. Изъ нихъ выписалась здоровою 1; съ улучшеніемъ въ гипсовомъ корсетѣ двое; 3 безъ улучшения, изъ нихъ одинъ поступалъ два раза; эти больные не поже-

ляли продолжительнаго лѣченія, каковое состоитъ въ вытяженіи позвоночника въ кровати или на аппаратѣ Sayr'a; этимъ способомъ мы достигали весьма утѣшительныхъ результатовъ, даже въ случаяхъ паралича нижнихъ конечностей, пузыря и кишки, какъ извѣстно стоящихъ въ зависимости отъ воспаленія позвоночника. Послѣ вытяженій, накладываемъ гипсовый или стеклянный корсетъ. Способа новаго Calot мы не примѣняли, ибо, насколько можно было изъ описаній убѣдиться, способъ этотъ имѣетъ въ виду главнымъ образомъ устраненіе уродства—„горба“, а самый болѣзненный процессъ устранить не въ состояніи, особенно когда теченіе острое и необходимо избѣгать травмы позвоночника. Что касается больной, одержимой туберкулезомъ костей нижнихъ конечностей, то она продолжительное время получала внутреннее лѣченіе, выписана была съ улучшеніемъ и на лѣто отправлена на дачу.

У гр. Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.

Съ болѣзнями мочеполовыхъ органовъ перебивало въ отдѣленіи 46 человекъ; каменная болѣзнь у 18 больныхъ: 17 мужчинъ и 1 женщины; камни въ пузырь у 15; въ мочеиспускательномъ каналѣ 2 и въ окружности канала у одного; сдѣлана операція 16 (см. оперативный отчетъ); у одного вышелъ камень самопроизвольно; одинъ выписанъ безъ операціи по настоящему желанію матери, ибо, полежавъ въ больницѣ въ покоѣ и на соответствующей діетѣ, мальчикъ сталъ удовлетворительно мочиться, хотя камень въ пузырь былъ и остался несомнѣнно.

Водянка сѣмяннаго канала у одного; сдѣлана операція; оправился.

Водянка яичка у 10 больныхъ; изъ нихъ 7 взрослыхъ и 3 дѣтей; первымъ сдѣлана операція по Volkman'у; дѣтямъ проколъ съ послѣдовательнымъ впрыскиваніемъ раствора карболовой кислоты; всѣ выздоровѣли (См. оператив. отчетъ).

Съуженіе мочеиспускательнаго канала у 10 больныхъ, изъ коихъ 2 старика имѣли гипертрофію предстательной желѣзы, всѣмъ дѣлано бужированіе; выписаны съ улучшеніемъ.

Свищъ мочеиспускательнаго канала послѣ бывшаго абсцесса у одного больного; отъ операціи отказался и выписался безъ улучшенія.

Разрывъ мочеиспускательнаго канала у одного больного, при паденіи ударившагося половымъ членомъ; оправился отъ бужирования черезъ 3 недѣли.

По одному случаю падаетъ на врожденный фимозъ; воспаленіе придатка яичка и воспаленіе самаго яичка; одному изъ нихъ сдѣлана операція; двоимъ соответствующее лѣченіе, выписались всѣ здоровыми.

Воспаленіе почекъ у 2 больныхъ; попали въ отдѣленіе, одинъ, имѣя ушибъ, другая для оперативнаго пособія,—вскрытіе гнойника околопочечнаго; оба оправились отъ ваннъ при соответственномъ внутреннемъ лѣченіи.

VI гр. Болѣзни пищеварительнаго аппарата.

Грыжи въ числѣ 19, изъ коихъ 17 мужчинъ и 2 женщины. Пахомошоночныхъ грыжъ ущемленныхъ и не ущемленныхъ по 9; бедренныхъ одна; большая часть грыжъ на правой сторонѣ, въ возрастѣ среднемъ; изъ осложняющихъ заболѣваній у одного была двусторонняя водянка яичка. Сдѣлана операція грыжесѣченія 12 больнымъ, изъ нихъ у 3 была ущемленная (2 паховыя и 1 бедренная); всѣ выздоровѣли (см. операт. отчетъ); пяти больнымъ грыжа вправлена и выписаны при хорошемъ состояніи здоровья съ биндажемъ; одинъ больной выписался съ явленіями начинающагося воспаления брюшины, не желая подвергнуться операціи грыжесѣченія; одинъ доставленъ на 6-й день заболѣванія, черезъ $\frac{1}{2}$ часа по доставленіи въ больницу умеръ.

Воспаленіе брюшины у одной произошло послѣ паденія; отмѣчены явленія поврежденія мочеваго пузыря, боль въ области мочеваго пузыря и кровь въ мочѣ; черезъ 6 дней выписалась съ улучшеніемъ.

Водянка живота. Было всего 9 больныхъ; всѣ женщины; изъ нихъ одна поступала 5 разъ, одна 2 раза, 2 больныя по 1 разу; о нихъ см. оперативн. отчетъ. Одна изъ этихъ больныхъ имѣла органической порокъ сердца, воспаленіе почекъ и общую водянку; асцитъ былъ до того рѣзко выраженъ, что самопроизвольно вскрылся и излился, почему больная и была положена въ хирургическое отдѣленіе; умерла черезъ $1\frac{1}{2}$ сутокъ.

Свищъ прямой кишки. У двоихъ больныхъ; послѣ операціи выбыли съ улучшеніемъ.

Трещины заднепроходнаго отверстія имѣлъ одинъ больной; оправился.

VII гр. Болѣзни желѣзъ.

Воспаленіе желѣзъ шеи въ хронической формѣ у 4 больныхъ—мужчинъ; всѣ въ возрастѣ около 20 лѣтъ; имѣютъ желѣзъы увеличенныя по нѣскольку лѣтъ; временами они у нихъ подвергаются болѣе острому воспаленію и помимо постоянной непріятности въ косметическомъ отношеніи, становятся помѣхою при занятіяхъ; всѣ подвергнуты операціи; выздоровѣли.

Заячья губа у одного; операція, выздоровѣлъ.

Заращеніе поздри послѣ оспы у одного больного; операція, выздоровѣлъ.

Отекъ гортанной щели имѣлъ одинъ больной; операція горлощеченія, выздоровѣлъ.

Заболѣваніе нервнаго характера у троихъ больныхъ, изъ коихъ только одна больная подлежала лѣченію въ хирургическомъ отдѣленіи, одержимая невралгіей; она послѣ ваннъ, массажа и электричества оправилась; двое были положены временно, при чемъ одинъ имѣлъ прогрессивный параличъ, другой воспаленіе спиннаго мозга; первый былъ переведенъ въ психіатрическую лѣчебницу, второй черезъ 3 недѣли, съ постоянными возрастающими болѣзненными припадками паралича, умеръ.

Инородныя тѣла извлечены у 4 больныхъ, у 5-го не найдено, хотя предполагалось; въ 2 случаяхъ была игла въ плечѣ; у одной кость въ глоткѣ; у одного пуля на бедрѣ; все выздоровѣли по удаленіи инородныхъ тѣлъ.

Носовое кровотеченіе у 5 больныхъ, изъ которыхъ 2 мужчинъ и 3 женщины; нѣкоторымъ пришлось дѣлать тампонаціи носоглоточнаго пространства зондомъ Вэллока; у другихъ останавливалась при помощи давно извѣданнаго, но почему-то часто забываемаго средства—ol. terebenthini.

Глубокій нагноительный процессъ былъ у 3 больныхъ; у 2 изъ нихъ въ глубокихъ мышцахъ груди, у одного во рту. Все выздоровѣли; при чемъ одной изъ этихъ больныхъ сдѣлана операція подъ хлороформомъ (см. оператив. отчетъ).

IX. Новообразованія доброкачественнаго характера.

Новообразованія были у 50 больныхъ; изъ нихъ 25 мужчинъ и 25 женщинъ; по гистологическому строенію:

Ангиома у 8 больныхъ—3 мужчинъ и 5 женщинъ; у троихъ была на нижней губѣ, у одного на лѣвой щекѣ, у одного подъ лѣвой бровью, у одного на лѣвомъ правомъ вѣкѣ, у одного на ягодицѣ и у одного на лѣвомъ плечѣ. Все 8 больныхъ подверглись операціи; 7 выписались съ вполне подрубцевавшими ранами, одна выписалась по желанію родителя съ подживающей послѣ операціонной раной.

Атерома была у 7 больныхъ; 2 мужчинъ и 5 женщинъ; у 4 на лицѣ, у 1 на головѣ, у 1 въ межъ-ягодичной складкѣ и у 1 на спинѣ. Все оперированы и выписались здоровыми.