

СОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ БЕЛОКРЫЛОГО ЖАВОРОНКА НА ЕВРОПЕЙСКОМ ЕГО-ВОСТОКЕ РОССИИ

В.П.Белик, В.М.Музаев

Ростовский противочумный институт, Калмыцкий университет

Основная область гнездования белокрылого жаворонка *Melanocorypha leucoptera* расположена, как известно (Волчанецкий, 1954), в степях Заволжья и Северного Казахстана, а к западу от Волги он появляется лишь эпизодически. Более или менее регулярно его отмечали только в полупустынях Дагестана, Калмыкии и прилежащих районов (Artzibascheff, 1859, по Самородову, 1982; Богданов, 1979; Беме, Ушатинская, 1932; Птушенко, 1949; Гептнер и Гладков, по Волчанецкому, 1954; Баников, 1959), но изолированные гнездовья или летние встречи белокрылого жаворонка имели место и дальше на запад: в Приманье, Сальских и Ставропольских степях, в Каменной степи на Верхнем Дону, в Харьковской обл. и даже в Крыму (Северцов, 1855; Никольский, 1891; Соколов, 1897, с.664; Браунер, 1906; Огнев, Воробьев, 1924; Петров, Миноранский, 1962; Варшавский, 1965; и др.). Более обычен он был в этих районах на зимовках (Волчанецкий, 1954; Самородов, 1968).

Однако в последние десятилетия на юге России белокрылый жаворонк появляется редко и в очень ограниченном количестве даже зимой (Хохлов, 1993). Например, В.Беликом за 25-летний период, с 1967 по 1992 г., на Нижнем Дону он был встречен лишь однажды - 05.04.87 (1 птица). Но в начале 1992 г. в низовьях Дона впервые удалось проследить массовый налет этих птиц. Они появились у г.Ростова в самом конце января (26.01.92 - 1 птица), что было связано, по всей видимости, с мощными снегопадами в Северном Казахстане, лишившими птиц зимнего корма и заставившими их покинуть места традиционных зимовок. В конце февраля (23.02.92) наблюдались уже большие стаи птиц, достигавшие порой 150-250 особей. Продержались они здесь до начала марта (последние встречи - 07.03.92), а затем, в связи с быстрым потеплением, практически сразу исчезли.

Держались белокрылые жаворонки обычно на низкотравных солончаковых дугах в поймах рек, где кормились по видушам, в коленях дорог, на проталинах. В начале марта некоторые самцы начали петь, в одиночку или группами совершая своеобразные токовые полеты высоко в небе над солончаками в дельте Дона. Можно было ожидать их