

21381  
190

VI.

216

КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО  
КЪ ПОЗНАНІЮ  
ПЛЕМЕНИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКАГО  
РОДА





У 381  
190

А

№1  
216

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

къ

ПОЗНАНІЮ ПЛЕМЕНЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ ГЛАВНЫХЪ ПРИЗНАКОВЪ, ОТЛИЧАЮЩИХЪ

ЕГО ОТЪ ДРУГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Составленное изъ сочиненій, объ этомъ предметѣ, Доктора Сосеротта и

Профессора Брока,

*П. А. Ловей-*  
**П. А. Л—ки.мѣ.**

Съ литографированными картинами.

12  $\frac{4x}{10}$  38

---

МОСКАВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1838.

А



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по ошпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ  
узаконенное число экземпляровъ. Москва. 1837 года Ноября 3го дня.

Ценсоръ В. Флеровъ.



48448-45



2007050498





# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

КЪ ПОЗНАНІЮ

ПЛЕМЕНЬ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

ГЛАВНЫХЪ ПРИЗНАКОВЪ, ОТЛИЧАЮЩИХЪ ЕГО ОТЪ ДРУГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.



## ПЛЕМЕНА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА.

Человѣкъ (по Греч. *ἄνθρωπος*, отъ *ἄνω* вверхъ, наверху, и *θεωρέω* смошрю; или отъ *ἄνω* вверхъ, *τρέπω*, обращаю, и *ὄψις*, *ὀπίς* лице, созерцаніе; по Лаш. *homo*, отъ *humus* земля, черноземъ; по Франц. *homme*; по Англ. *man*; по Нѣмц. *Mensch*, отъ Санскритскаго слова „Манудша“, т. е. отъ Бога произшедшій) — размашприваемый съ тѣлесной спороны, естъ живошное млекопитающее, двурукое и двуное, одаренное вершикальнымъ положеніемъ шѣла, рѣчью; а съ духовной — существо мыслящее, свободное и безсмертное.

Родъ человѣческій происходишь отъ одной чешы, „Адама и Еввы“. Не смошря на то, географическія и физическія вліянія климашовъ, среди копорыхъ онъ распроспранился по земному шару, сполько измѣнили первоначальный соспавъ плошныхъ и жидкихъ часпей его организаціи, чшо первообразы его (Адамъ и Евва) распались на множесство формъ какъ бы производныхъ или вшоричныхъ, копорыя, нимало не перяя сущесшвенныхъ свойствъ, сродныхъ основной человѣческой формѣ, опличающся однѣ отъ другихъ собсшвенными физическими и динамическими признаками. — Замѣчашельно, чшо эши физическіе и динамическіе признаки, напечатлѣнные на органическомъ ихъ соспавѣ, и обнаруживающіеся въ самыхъ жизненныхъ ихъ дѣйствіяхъ, споль сдѣлались прочными и посшоянными, чшо не смошря ни на какія вліянія, они сохраняющъ главныя свои выраженія неизгладимо, во всѣ времена и во всѣхъ климашахъ, чрезъ весь длинный рядъ пошомковъ и предковъ. Изъ числа эшихъ признаковъ самый примѣчашельный — цвѣшность кожи.

И шакъ родъ человѣческій соспавляетъ одно великое цѣлое, и сосшопшь сполько изъ одного вида „*Homo sapiens*“, но раздробленнаго, подобно бѣдому солнечному лучу, на нѣсколько цвѣшныхъ разностей, подавшихъ поводъ



раздѣлилъ людей на столько отдѣльныхъ группъ, сколько находилъ главныхъ различій въ цвѣтѣ кожи. Эти группы названы племенами (*racae*). Линней, принявъ за основаніе эту различную цвѣтность кожи, раздѣлилъ родъ человѣческій на пять племенъ: 1 на Американское — бурое, 2 на Европейское — бѣлое; 3 Азіатское — желтое; 4 Африканское — черное; и 5 безобразное или уродливое (*monstrosa*).

Послѣ Линнея начали обращать вниманіе и на другіе физическіе признаки, различающіе людей однихъ отъ другихъ. Такъ Петръ Камперъ, разсматривая черепа людей, принадлежащіе различнымъ племенамъ, нашелъ, что кости лица и черепа имѣютъ у нихъ различную длину, ширину и направленіе, и что по этимъ признакамъ легко можно опредѣлить, къ какому племени принадлежитъ изслѣдуемый черепъ. „Если, говоритъ онъ, проведемъ двѣ прямыя линіи, которыя бы себя взаимно пересѣкали, и изъ которыхъ бы одна проходила горизонтально отъ края верхней челюсти, чрезъ наружный слуховой проходъ, къ запылку (карш. I. фиг. II), а другая, отъ того же края, проспиралась бы прямо кверху до выпуклой части лобной кости; то выдѣль уголъ, называемый личнымъ, котораго опроверженіе, на черепѣ людей бѣлыхъ, будетъ составлятъ отъ 85 до 90 градусовъ, на черепѣ Монгольскаго племени отъ 80 до 85 град., а на черепѣ Негра отъ 75 до 80 град.; въ черепѣ же Орангъ-ушанга — не болѣе 65 град.“ Этошъ способъ измѣренія названъ „личною линіею“ (*linea facialis*).

Блюменбахъ употребляетъ другой способъ, который называется темяннымъ или макушечнымъ (*norma verticalis*). Для этого онъ ставитъ рядомъ нѣсколько череповъ на одну доску, такъ, чтобы они скуловыми своими костями образовали одну горизонтальную линію, и смотритъ на нихъ сзади и сверху (съ макушки), и судитъ о различіи ихъ по направленію или челюстей, или скуловыхъ костей; также и по тому: широкъ ли черепъ, или узокъ; лобъ плоскъ или выпуклъ.

Вообще, въ наше время, раздѣленіе рода человѣческаго на племена преимущественно основывается на цвѣтѣ кожи, величинѣ и формѣ черепа, равно какъ и на величинѣ личного угла. — Блюменбахъ раздѣляетъ людей на пять племенъ: 1 Кавказское (*Varietas Caucasica*); 2 Монгольское (*V. Mongolica*); 3 Египетское (*V. Aethiopica*); 4 Американское (*V. Americana*); 5 Малайское (*V. Malaica*).

Дюмериль въ своихъ „*Les elemens des sciences naturelles*“ принимаетъ такъ же пять племенъ въ человѣческомъ родѣ: 1 Кавказское, или Арабо-Европейское; 2 Гиперборейское; 3 Монгольское; 4 Негрское; 5 Американское.

Знаменистый Кювье принимаетъ только при такихъ племенахъ, которыя можно оплчить другъ отъ друга ясными и очевидными признаками: 1 Бѣлое или Кавказское; 2 Желтое или Монгольское; и 3 Негрское или Египетское.

*Desmoulins* раздѣляетъ людей на одиннадцать племенъ: 1 составляющъ: Кельто-Скифо-Арабы; 2 Монголы; 3 Египты; 4 Восточные Африканцы; 5 Южные Африканцы; 6 Малайцы или Океанійцы; 7 Лапландцы; 8 Негры Океанійскіе; 9 Австралы; 10 Коломбійцы; 11 Американцы.