

ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!

№11 (389) июнь 2016 г.

Читайте в этом номере:

ОШИБКИ В ВЫРАЩИВАНИИ КОСТОЧКОВЫХ

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Вишню и сливу нередко высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых придётся отказаться.

Необходимо знать глубину залегания грунтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5-2 метров от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не стоит, т.к. насаждения будут недолговечными, через несколько лет, когда корни достигнут грунтовых вод, деревья начнут погибать. При близком стоянии грунтовых вод косточковые можно выращивать только на холмах, но и в этом случае деревья будут не такими долговечными, как при выращивании в оптимальных условиях.

Другой типичной ошибкой садоводов-любителей является загущенная посадка деревьев. При сближении крон ухудшается освещённость ветвей, они вытягиваются, плохо плодоносят. К тому же за такими деревьями сложно ухаживать. Это обстоятельство нужно учитывать при закладке сада.

Косточковые культуры

могут пострадать от подопревания коры в районе корневой шейки. Поэтому их не нужно высаживать в местах; где слишком много снега, а весной застаиваются талые воды. Их нужно обязательно отводить.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений.



Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание. Всё это усиливает опасность зимнего подмерзания. Ни в коем случае нельзя под кос-

Часто причиной слабого плодоношения вишни и сливы является отсутствие сорта – опылителя или неправильный подбор опылителя. При посадке деревьев одного сорта косточковые обычно хорошо цветут, но почти не плодоносят, т.к. плоды не завязываются. При посадке косточковых культур нужно высаживать сорта – опылители (одинакового срока цветения с основным сортом). Если места в саду недостаточно для посадки нескольких деревьев, можно привить черенки другого сорта в крону вашего дерева. В крайнем случае во время цветения можно поставить цветущие

ветки, срезанные с дерева другого сорта, в банке с водой и поместить в крону дерева.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Это может случиться и в сравнительно тёплые зимы, если даже небольшие морозы чередуются с оттепелями. Если плодовые почки не распускаются, значит, они вымерзают.

Нередко из-за весенних заморозков подмерзают – цветки (зачастую только пестики). В этом случае дерево обильно цветёт, но плодов не завязывает. Поэтому, в первую очередь, нужно подбирать более зимостойкие сорта, во-вторых, защищать их во время заморозка (дымление и т.п.).

Е. Дмитриева



Ксения

точковые вносить свежий навоз. При мульчировании приствольных кругов нельзя засыпать ствол перегноем или другим мульчирующим материалом, т.к. возможно подопревание.

КУЛЬТУРА НОМЕРА: СТЕВИЯ



ЗАЩИТИМ ЗЕМЛЯНИКУ



ДЕЛЬФИНИУМ ИЗ СЕМЯН



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ОВОЩНАЯ ХРИЗАНТЕМА
- ПОДКОРМКИ В САДУ
- ВЕРЕСКОВЫЕ ПОЛЯНЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель! Календула обладает рядом полезных свойств, в том числе отпугивает огородных вредителей. Но для эффективной защиты ноготки и овощи должны расти рядом, на одной грядке. Причём количество растений ноготков должно составлять 10-20% от всех растений, высаженных на грядках. Можно также посеять календулой (в 2-3 ряда) грядки с овощами. Для оздоравливания участков, заражённых нематодами или фузариозом, их в течение 2-3 лет засевают календулой, заделывают её осенью в почву. Растения, поражённые мучнистой росой, в почву не заделывают, а сжигают.

С уважением, гл. редактор

