



ПРОФ. А. А. БРАУНЕР

**ПОРОДЫ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ**

ОВЦЫ И КОЗЫ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМЗЕМА УКРАИНЫ
ОДЕССА 1923 - - - -**

636.3

Б87

ПРОФ. А. А. БРАУНЕР

ПОРОДЫ СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ


II. ОВЦЫ И КОЗЫ



ТАБЛИЦЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. А. А. БРАУНЕРА и агр. С. Ф. СЛАВОВА

Фундаментальная биб-ка



ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМЗЕМА УКРАИНЫ
ОДЕССА—1923

А

Настоящий выпуск под заглавием „Овцы и Козы“ составляет 2-ую часть серии „Породы сельскохозяйственных животных“.

Перед характеристикой главных пород овец и коз я считаю необходимым дать очерк происхождения их.

Происхождение многих пород овец еще окончательно не выяснено по следующим причинам: 1) овца—одно из древнейших домашних животных, и потому она сильно изменилась под влиянием одомашнения: напр., увеличилось число хвостовых позвонков у длиннохвостых и жирнохвостых, или уменьшилось число их (у курдючных), появились наросты жира на ягодицах и над хвостом (курдюк), изменился состав волосяного покрова: исчезла ость, а пух стал тоньше и гуще, как у меринуса, и т. п.; 2) многие породы выведены еще в незапамятные времена от скрещивания пород, происходящих от разных диких видов, и подверглись самому разнообразному воздействию природных, культурных и хозяйственных условий; 3) недостаточная изученность пород, особенно в России.

Однако, все же выяснено, что современные овцы произошли от четырех диких видов, из коих три дали громадное количество пород: 1) от муфлона (*Ovis musimon* L.) и его разновидностей, ныне живущих в Корсике, Сардинии, Кипре, Малой Азии и северозападной Персии¹⁾; 2) от аркара (*Ovis arcar* Brandt, *Ovis vignei* Blyth, и *Ovis* ~~flaristanica~~ *flaristanica* Nasonoff), распространенного от северо-восточной Индии (Кашмир и Ладак) далеко на запад через Афганистан и Белуджистан до Восточной Персии и до южных и восточных берегов Каспийского моря (Копет-даг, Большие Балханы, Устюрт)²⁾; 3) от аргали (*Ovis argali*, Pall., *Ovis ammon* и другие виды); 4) от гривистой овцы (*Ammotragus tragelaphus*, Desm.), живущей в северной Африке.

Более детальное установление вида, от которого произошла данная порода, затруднительно, но в общем выяснено, что от гривистой овцы про-

¹⁾ Академик Н. Насонов разделяет группу муфлона на следующие виды: *Ovis musimon*, L., водящийся на остр. Корсике и Сардинии, *Ovis orientalis* (Brandt), распространенный на остр. Кипре, в южной части Малой Азии и Армении, и *Ovis urmiana* (Günther), живущий в северозападной Персии (Н. В. Насонов. Муфлоны и близкие к ним формы диких баранов. Известия Акад. Наук. Спб. 1913).

²⁾ Н. Насонов. *Ovis arcar* и близкие к нему формы диких баранов. Известия Академии Наук, Спб. 1913.