

ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
ПО ОТДѢЛЕНІЮ ЭТНОГРАФІИ. ТОМЪ XXXIV.

„Сборникъ въ честь семидесятилѣтія Григорія Николаевича Потанина“.

W 205
1977
Г. Е. Грумъ-Гржимайло.

Бѣлокурая раса

въ Средней Азіи.

—
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Θ. Кишбаума (отдѣленіе), Новоисаакіевская, 20.

1909.

А

государственная
библиотека
СССР
И. В. М. Ленина

7091-52

Г. Е. Грумъ-Гржимайло.

Бѣлокурая раса въ Средней Азiи.

Поводомъ къ составленiю этой статьи послужили читанные В. И. Анучинымъ въ Географическомъ обществѣ доклады объ енисейскихъ остякахъ, матеріаломъ же—по преимуществу данныя, которыми я уже пользовался при составленiи главы VIII т. II и главъ II и III т. III «Описанiя путешествiя въ Западный Китай». Въ этихъ главахъ литература вопроса о бѣлокурой расѣ Внутренней Азiи оказалась почти исчерпанной, такъ что новымъ въ настоящей статьѣ является лишь нѣсколько иная распланировка матеріала, дающая болѣе полное освѣщенiе затрагиваемому въ ней предмету и рельефнѣе выдѣляющая значенiе излагаемыхъ въ ней фактовъ. Подбирая эти послѣднiе, я однако не забывалъ, что исторiя должна писаться *ad narrandum non ad probandum*.

«Можно считать доказаннымъ существованiе въ былыя времена въ Центральной и Сѣверной Азiи расы съ зелеными глазами и рыжими волосами. Но что же случилось съ ней?»

Топинаръ.

Поставленный Топинаромъ вопросъ еще очень мало разработанъ, и даже тому, что намъ въ этомъ отношенiи извѣстно, я могу дать, въ тѣсныхъ предѣлахъ настоящей статьи, лишь самый поверхностный очеркъ. Тѣмъ не менѣе я все же попытаюсь, хотя бы въ общихъ чертахъ, нарисовать картину постепеннаго поглощенiя монгольскимъ моремъ территорiи, первоначально занятой этой расой.

Зап. И. Р. Г. О. по отд. Этн.
т. XXXIV.

Раскопки кургановъ и могилъ показываютъ, что уже въ эпоху доисторическую въ долину р. Селенги столкнулись два этническихъ антипода — крайняя короткоголовая (головной указатель—93,6) и крайняя длинноголовая (тотъ же указатель—68,4) расы¹. Первая отличалась большой высотой черепного свода, необыкновенной шириной затылка и грубостью формъ какъ нижней челюсти, такъ и всѣхъ частей черепа, вторая — значительной вертикальной сплюснутостью черепа, сильнымъ развитіемъ надбровныхъ дугъ и длиннымъ и плоскимъ теменемъ.

Но эти первобытныя расы, изъ коихъ вторая, можетъ быть, ближе всего подходила къ австралійской, съ теченіемъ времени исчезли, и имъ на смѣну въ той же области явилась новая народность поддлинноголового типа съ умѣренно-высокимъ черепнымъ сводомъ, умѣреннымъ лбомъ и небольшимъ затылкомъ. Но и эта народность не удержалась на Селенгѣ и, вѣроятно, въ началѣ нашей эры уступила свое мѣсто среднеголовому племени, отличавшемуся, при среднемъ ростѣ, крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, очень развитою мышечною системою и непропорціонально большой головой съ высокимъ черепнымъ сводомъ. Еще позднѣе здѣсь появился новый народъ подкороткоголового, судя по женскимъ черепамъ, даже короткоголового типа, съ узкимъ лбомъ и ясно выраженной у большинства платицефаліей. Наконецъ, въ VI вѣкѣ, а можетъ быть и раньше, въ той же области произошло новое перемѣщеніе этническихъ массъ, причемъ очевидное преобладаніе получили крайніе короткоголовые, отличавшіеся низкимъ ростомъ, малыми размѣрами черепа, узкимъ лбомъ и большинство — платицефаліей.

Такимъ образомъ въ западномъ Забайкальѣ и въ порубежной Монголіи обнаружился процессъ весьма послѣдовательнаго

¹ Матеріаломъ для послѣдующихъ строкъ служили, печатавшіеся въ Протоколахъ и Трудахъ Троицкосавско-Кяхтинскаго отдѣленія Приамурскаго отдѣла Императ. Русск. Географич. Общества, отчеты Талько-Грындевича о произведенныхъ имъ въ западномъ Забайкальѣ раскопкахъ. Сводныя данныя результатовъ этихъ раскопокъ читатель найдетъ въ вып. 1 тома VIII означенныхъ «Трудовъ» (1905), а также въ статьѣ — Talko-Grunciewicz — «Materiały do paleoetnologii mogił Azyi Wschodniej», помѣщенной въ «Materiały antrop.-archeol. i etnograf. Akad. Umiejętności w Krakowie», III, Dz. 1.