

М. Балчунов

6

H. ANDRUSOVЪ.

СПИСОКЪ НАУЧНЫХЪ РАБОТЪ.

(1883—1909).

1. Замѣтка о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ окрестностяхъ города Керчи. (*Notiz über die geologische Untersuchungen in der Umgebung von Kertsch*). Зап. Нов. Общ. ест. Томъ IX, вып. 1. Одесса. 1883, 15 стр.

Первая геологическая работа, написанная въ бытность студента Новороссийского университета. Констатируется присутствие средняго міоцена въ Крыму, устанавливается отличіе керченского известняка отъ одесского и его эквивалентность съ „нереходными пластами“ проф. Синцова, устанавливается палеонтологическое различіе камышбурунскихъ фаленовъ и рудныхъ пластовъ и присутствіе у Чокракского озера полупрѣсноводныхъ отложений съ каспийскими элементами въ фаунѣ.

2. Геологическія изслѣдованія на Керченскомъ полуостровѣ, произведенныя въ 1882 и 1883 г. (Отдѣльные оттиски съ обложкой: къ геологіи Керченского полуострова. Часть I. Геологическое строеніе восточной половины Керченского полуострова. (*Geologische Untersuchungen auf der Halbinsel Kertsch in den Jahren 1882 und 1883*). Зап. Нов. Общ. ест. Т. IX, вып. 2, стр. 1—190. 1884. Одесса 2 таблицы профилей.

Стратиграфическая и геотектоническая наблюденія въ восточной половинѣ Керченского полуострова. Установленіе „чокракскаго известняка“, очеркъ его фауны. Существование двухъ толщи темныхъ сланцевыхъ глинъ. Чокракский известнякъ у Георгіевскаго монастыря. Сарматскій габитусъ чокракскаго известняка.

Сарматскія отложенія. Батиметрическія отношенія послѣднихъ. Строительный (керченскій) известнякъ, раздѣленіе его на три горизонта. Fauna нижнихъ конгераевыхъ пластовъ и руднаго горизонта. Параллелизациѣ пластовъ. Керченскій известнякъ соответствуетъ переходнымъ пластамъ Одессы и Бессарабіи. Одесскій известнякъ соответствуетъ фаленамъ Камышбуруна.

Послѣтретичныя отложенія: Ракушникъ съ *Cardium crassum* Чокракскаго озера и Тобечика, морскіе послѣтретичные ракушника Чокрака, Тобечика, Кызаула, пески Аджибая, лѣсъ. Рядъ геотектоническихъ данныхъ. Констатированъ рядъ до сихъ непознанныхъ антиклиналей и синклиналей.

3. Ueber das Auftreten der Marin-Mediterranen Schichten in der Krim. Verhandlungen d. k. k. geol. R. A. 1884, № 11, 4 pp.

Замѣтка на нѣмецкомъ языке о находженіи средняго міоцена около Керчи.

4. Ueber das Alter der unteren dunklen Schieferthone auf der Halbinsel Kertsch. (*О возрастѣ нижнихъ сланцевыхъ илінѣ Керченского полуострова*). Verhandl. d. k. k. geol. R. A. 1885, № 8, р. 213—216.

Сообщеніе объ открытіи на мысѣ Тарханѣ валуновъ съ *Resten denudatus* и другими окаменѣлостями, напоминающими шлиръ и соленосныя глины Велички. Нахожденіе спиріалісовъ въ керченскихъ третичныхъ отложеніяхъ.

Табличка пластовъ Керченскаго полуострова, въ которой впервые выдѣляются **спаніодонтовые** пласти.

5. Ueber zwei neue Isopodenformen aus neogenen Ablagerungen. (*О двухъ новыхъ формахъ изоподѣ изъ неогеновыхъ отложений*). N. Jahrb. f. Min. 1886. Bd. II, Heft. 2 p. 155—174. 7 Textfig. 1 Taf.

Описаніе *Cymodocea sarmatica* n. sp. изъ сарматскихъ пластовъ горы Ахтиаръ у Тобечинскаго озера (Керч. полуостровъ) и *Palaega anconaeana* изъ такъ наз. шлира Анконы (Италія).

6. Die Schichten von Kamyschburun und der Kalkstein von Kertsch in der Krim. (*Пласти Камышбуруна и керченскій известнякъ*). Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1886. XXXVI. 1 Heft. Wien. p. 127—140.

Характеристика рудныхъ пластовъ, фаленовъ Камышбуруна, пластовъ съ *Cardium Abichi* и керченскаго известняка. Параллели

сь Херсонской губернієй. Керченскій известнякъ соотвѣтствуетъ допонтической эпохѣ Зюсса, тому пробѣлу, который замѣчается между сарматомъ и конгревыми пластами Австро-Венгрии и между сарматскими и понтическими пластами многихъ пунктовъ юга Россіи. Въ Италії керченскому известняку соотвѣтствуетъ зона В. и нижняя часть зоны А. сѣрногипсовой формаци. Верхняя часть зоны А (по Босняцкому) принадлежитъ къ эквивалентамъ камышбурунскихъ фаленовъ и пр. Дозиневый известнякъ Истрицы въ Румыніи эквивалентъ керченскаго, а равно и пласти съ *Pyrgula margarita* въ Зипенбюргенѣ, тогда какъ верхніе горизонты шеклерскихъ отложений также соотвѣтствуютъ камышбурунскимъ фаленамъ.

7. О характерѣ міоценовыхъ осадковъ Крыма (*Ueber das Charakter der Miocänablagerungen in der Krim.*). Труды Спб. общ. ест. 1886. Т. XVII, вып. 2, стр. 59—61.

Резюме сообщенія. Бѣлые мергели Крыма причисляются къ средиземноморскому ярусу; имъ въ восточной половинѣ Крыма соотвѣтствуютъ темныя сланцевыя глины. Замѣчанія о сарматскихъ отложенияхъ Крыма.

8. Геологическія изслѣдованія въ западной половинѣ Керченского полуострова, произведенныя лѣтомъ 1884 г. (*Geologische Untersuchungen in der Westlichen H鋖fte der Halbinsel Kertsch.* Зап. Новоросс. общ. ест. XI. 1887, стр. 69—147.

Описаніе ряда обнаженій въ западной половинѣ полуострова (Парпачскій гребень, Южная равнина) и по Азовскому побережью оть Акманая до Аджибая. Нѣкоторыя дополненія къ геологіи восточной половины полуострова (описаніе обнаженій у хут. Шепелева и валуновъ съ *Pecten denudatus* Reuss мыса Тархана, см. № 4, открытие керченскаго известняка въ Чокрабабчикской синклинали, сарматскія отложения Аджи-эли, Аргинъ-тобечикъ, Джермай-качицъ, нахожденіе устрицъ въ керченскомъ известнякѣ).

Возрастъ валуновъ мыса Тархана, глубоководный характеръ нижнихъ темныхъ глинъ, сарматскій габитусъ чокракскаго известняка, выдѣленіе и характеристика спаюндонтовыхъ пластовъ. Глубоководный характеръ нижнесарматскихъ глинъ, трансгрессивное заlegenіе сармата въ западномъ Крыму. Две фации средняго сармата (песчаники Петровска и связанные съ ними известники, и мергели Янышъ-Такыла и др. и связанные съ ними мианковые известники). Особенности верхнесарматскихъ глинъ. Критическія замѣчанія о мианковыхъ известнякахъ самыхъ верховъ сармата: