

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Машкин В.И. Адаптивная стратегия размножения у сурков (<i>Marmota</i>)	3
Валуев В.А., Загорская В.В. Распространение бобра <i>Castor fiber</i> (L.) в северо-западных районах Башкирии	14
Романов А.А., Мелихова Е.В., Яковлев В.О. Бурый дрозд (<i>Turdus eunotus</i>) на плато Путорана	18
Корсуновская О.С. Звуковая коммуникация и распознавание призывного сигнала у кузнечика <i>Isophya gracilis</i> Mir. (Orthoptera, Phaneropteridae)	26
Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. Новый вид подрода <i>Hanibotus</i> Reitter, 1912 рода <i>Otiorhynchus</i> Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) из Турции	31
Просвилов А.С. Новые данные о распространении <i>Sericus sulcipennis</i> Buysson, 1893 (Coleoptera: Elateridae) на территории России	37
Тоскина И.Н. Дополнение к определительной таблице палеарктических видов рода <i>Xyletinus</i> Latreille, 1809, подрода <i>Xyletinus</i> (S. Str.) (Coleoptera: Ptinidae: Xyletininae)	41
Галинская Т.В. Микротрихии на мембране яйцеклада представителей Ulidiidae и Otitidae (Diptera)	44
Колесниченко К.А. Выделение лектотипов <i>Melitaea didymoides</i> Eversmann, 1847 и <i>Melitaea didyma</i> var. <i>latonia</i> Grum-Grshimailo, 1891 (Lepidoptera, Nymphalidae) с замечаниями по идентификации синтипов	47
Бязров Л.Г. Пространственное распределение на присоединенной в 2012 г. к Москве территории Индекса чистоты атмосферы, определенного по показателям эпифитной лишенобиоты	51
Еськов А.К., Дубовиков Д.А. Сообщество мирмекофильных эпифитов формации керангас острова Борнео	60
Петрова С.Е. Половая структура популяции двудомного вида зонтичных <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk. (Umbelliferae)	70
Костина М.В., Ясинская О.И., Битюгова Г.В. Интенсивность пыления березы повислой (<i>Betula pendula</i> Roth.) в зависимости от строения побегов с мужскими сережками	79