

632.7
9-39

Н. С. ДЕХТЯРЕВ

ВИШНЕВАЯ МУХА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЮ



ХАРКІВ—1927

А

Окремий відбиток із журналу „Вісник плодоводства,
виноградництва та городництва“ № 4, квітень—1927.

Вишневая муха и меры борьбы с нею

I

В последние годы на Украине наблюдается весьма значительный вред, наносимый вишням, помимо вишневого долгоносика (*Rhynchites auratus* Scop.), еще личинкой вишневой мухи (*Rhagoletis cerasi* L.). Так, например, большой вред от личинок этой мухи наблюдается в садах Мелитопольского округа; кроме того плоды вишни, присылаемые многочисленными корреспондентами Центральной Станции Защиты Растений из самых разнообразных мест, не редко носили на себе следы деятельности личинок вишневой мухи.




Рис. 1. Вишневая муха.

Здесь надо отметить, что повреждения, причиненные вишням вишневой мухой в большинстве случаев смешивались с повреждениями вишневого долгоносика, который, к слову сказать, вредил едва-ли меньше, или же объяснялись «гнилью». Между тем работу вишневого долгоносика легко отличить от повреждений иных насекомых. Плоды вишен используются им как для корма, так и для откладки яиц. В первом случае жук выгрызает на поверхности плода круглые или неправильной формы мелкие ямки. Яичко же откладывается в глубокую, затрагивающую даже стенку косточки, ямку, вокруг которой самка выгрызает глубокий желобок в виде колечка. Впоследствии место